

SPECIAL K-S

Το **SPECIAL K-S** είναι υγρό πυκνό λίπασμα Καλίου Θείου.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

15,5 w/w 20 w/v ΘΕΙΟ (S)
23,4 w/w 30 w/v ΚΑΛΙΟ (K₂O) (υδατοδιαλυτό)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το θειοθειικό κάλιο είναι αποτελεσματικό σε υδρολιπάνσεις όταν το έδαφος είναι αλκαλικό, καθώς έχει την ιδιότητα να απελευθερώνει θείο το οποίο με την βοήθεια μικροοργανισμών του εδάφους μειώνει το pH. Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της μέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η εφαρμογή του λιπάσματος συντελεί στην αποφυγή και διόρθωση των τροφωπενιών καλίου, στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων καρπών (γεύση, άρωμα, χρωματισμός, περιεκτικότητα σακχάρων κ.τ.λ.), στην αύξηση της αντοχής των φυτών στη ξηρασία, στις περιβαλλοντικές αντιξοότητες και στην αύξηση της διάρκειας της μετασυλλεκτικής συντήρησης των καρπών.

Το θειοθειικό κάλιο είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υδρολιπάνσεις όταν το έδαφος είναι αλκαλικό, καθώς έχει την ιδιότητα να απελευθερώνει το θείο το οποίο με την βοήθεια των μικροοργανισμών του εδάφους μειώνει το pH.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Γενική δοσολογία: 1-2 λίτρα / 1000m² μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-400 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό. Επανάληψες όταν είναι αναγκαίο κάθε 15-20 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα / γιγαρτόκαρπα: 1-3 φορές συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 200-300 κ.εκ. / λίτρα νερό 2η εφαρμογή 10-15 μέρες μετά με την ίδια δοσολογία. Επανάληψη αν χρειαστεί με την ίδια δοσολογία μετά από 10 ημέρες.

Εσπεριδοειδή: 1η εφαρμογή κατά την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών με 200-300 κ.εκ. / λίτρο νερό. 1-2 επαναλήψεις με την ίδια δοσολογία.

Ελιά: 1η εφαρμογή στο "γυάλισμα" του καρπού με 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό και επανάληψη φυτό κάθε 15-20 ημέρες με 200-400 κ.εκ. / λίτρο νερό.

Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές από το στάδιο του περκασμού με 200-300 κ.εκ. / λίτρο νερό και κάθε 15-20 ημέρες με την ίδια δοσολογία.

Κηπευτική φράουλα: 300-400 κ.εκ. / λίτρο νερό στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού των καρπών. 1-2 λίτρα / 1000m² για εφαρμογές μέσα από το διάστημα άρδευσης.

Πατάτα: 1η εφαρμογή μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης με 200-400 κ.εκ. / λίτρο νερό ή με 2-3 λίτρα / 1000m² με το σύστημα άρδευσης. Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.

Καρότο, σκόρδο: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-300 κ.εκ. / λίτρο νερό από τον σχηματισμό του ριζώματος και έπειτα.

Να χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη. Μην ξεπερνάτε τις κατάλληλες δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Σε ψεκαστικά διαλύματα του θειοθειικού καλίου το pH δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 6. Επίσης, δεν ενδείκνυται η εφαρμογή σε εδάφη με pH χαμηλότερο του 6.

Συσκευασίες: 250ml / 1LT / 5LT / 10LT / 20LT

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



**Δεν αποτελεί
φυτοπροστατευτικό
προϊόν**



ΣΕΛ. 41



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —