

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

(χημική ομάδα: Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα)

# E LEGANT 5 EC

quizalofop-p-ethyl (κουιζαλοφώπ-π-εθύλ) 5% β/ο

**Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων**

Πεδίο εφαρμογής: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά), ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Φράουλα), ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδια, Σκόρδο, τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς), ΟΣΠΡΙΑ (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια), ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια, Ηλιάνθος, Βαμβάκι), ΠΑΤΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευλα, καπνός, Μηδική), ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μία (1).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 PSI (2-3 ατμ.). Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος και πρέπει να αποφεύγεται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Κολοκύθι: 7 ημέρες, Μηδική: 21 ημέρες, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια: 21 ημέρες, Ηλιάνθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα: 35 ημέρες, Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο: 49 ημέρες, Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά: 56 ημέρες, Ζαχαρότευλα, Σόγια: 60 ημέρες, Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο: 70 ημέρες, Βαμβάκι: 80 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Συσκευασίες: 250ml / 500ml / 1LT / 3LT

**ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

**ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.**

**Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015**



115

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —



# ΕLEGANT 5 EC

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

### Πεδίο εφαρμογής:

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά), **ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ** (Φράουλα), **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, Κρεμμύδια, Σκόρδο, τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς), **ΟΣΠΡΙΑ** (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια), **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ** (Σόγια, Ηλίανθος, Βαμβάκι), **ΠΑΤΑΤΑ**, **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ** (Ζαχαρότευτλα, καπνός, Μηδική), **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ**.

**Στόχοι-Δόσεις:** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:** 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Για **Πολυετή ζιζάνια:** 200-300 κ.εκ./στρέμμα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ.

**Χρόνος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:** Μία (1).

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

**1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: *Alopecurus spp.* (αλεπονουρές), *Apera spicaventi* (ανεμόχορτο), *Bromus spp.* (βρώμοι), *Dactylis spp.* (δακτυλίδες), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Eleusine indica* (ελευσίνη), *Hordeum spp.* (κριθάρια), *Lolium spp.* (ήρες), *Phalaris spp.* (φαλαρίδες), *Panicum spp.* (πάνικο), *Setaria spp.* (σετάρια), *Sorghum halepense* (βέλιουρας από σπόρο), *Triticum spp.* (σιτάρια).

**Πολυετή ζιζάνια:** *Agropyron repens* (αγρόπυρο), *Agrostis stolonifera* (άγρωστις), *Cynodon dactylon* (αγριάδα), *Paspalum spp.* (πάσπαλο), *Sorghum*

*halepense* (βέλιουρας από ριζώματα).

**2. Ανθεκτικά ζιζάνια:** Όλα τα πλατύφυλλα.

**3.** Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

**4. Χρόνος εφαρμογής:** Το *Cynodon dactylon* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15-20 εκατ. Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45-50 εκατ. Η *Poa annua* (ετήσια πτόα) καταπολεμείται όταν έχει 1-4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμμα.

**5.** Να μην ψεκάσετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

**6. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:**  
● Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. ● Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ● Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. ● Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. ● Μην αυξάνετε τις δόσεις. ● Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό. ● Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. ● Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

116

05/2020



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —

