

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

LEGANT 5 EC

quizalofop-p-ethyl (κουιζαλοφόπ-π-εθύλ) 5% β/ο

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των ζιζάνιων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα των ζιζανίων.

Στόχος - Δόσεις σκευάσματος: Για **i)** Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια*: 100-200 κ.εκ./στρέμμα, **ii)** Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*: 100-300 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-40 λίτρα/στρέμμα.

Πεδίο Εφαρμογής - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μηλιά, Ροδακινιά: Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας έως την αρχή της ανθοφορίας (BBCH 12-59). **Φράουλα (Υ):** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως ότου οι πρώτοι στόλωνες (ριζοκονδύλια) γίνουν ορατοί (BBCH 12-39). **Κρεμμύδι, Σκόρδο, Φασολάκια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό), Μπιζέλια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό), Όσπρια (Φακή, Ρεβύθια), Καπνός, Ζαχαρότευτλα:** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του στέλεχος (BBCH 12-39). **Τομάτα (Υ):** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως ότου το 9ο (ή περισσότερα) φύλλο του κύριου βλαστού έχει ξεδιπλωθεί πλήρως / πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 12-39). **Πατάτα:** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως την πλήρη κάλυψη του εδάφους (κλείσιμο των γραμμών): περίπου το 90% των φυτών συναντώνται μεταξύ των γραμμών (BBCH 12-39). **Βάμβακι, Ηλίανθος, Σόγια:** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το στάδιο των 9 ή περισσότερων εμφανώς επιμηκυμένων μεσογονατίων διαστημάτων (BBCH 12-39). **Μηδική:** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το τέλος της επιμήκυνσης των μεσογονατίων διαστημάτων / πριν την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 12-39). **Καλλωπιστικά (Υ):** Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το τέλος της επιμήκυνσης του βλαστού (BBCH 12-39). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μία (1) εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης.

Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά. **2.** Υ (Χρήση υπαίθρου). **3.** Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Η δόση των 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. να εφαρμόζεται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια: -Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρ.: α)** Ευαίσθητα: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halapense*), Ήρες (*Lolium sp.*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Φαλαρίδες (*Phalaris sp.*). **β)** Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοκρίθαρο (*Hordeum vulgare*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Ανεμόχορτο (*Apera spicaventi*), Βρώμος (*Bromus sp.*), Δακτυλίδες (*Dactylis sp.*), Ελευσίνη (*Eleusine indica*), Πάνικο (*Panicum sp.*), Στάριες (*Setaria sp.*), Σιτάρια (*Triticum aestivum*). **-Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια στη δόση των 300 κ.εκ./στρ.: α)** Ευαίσθητα: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Βέλιουρας από ριζώματα (*Sorghum halepense*). **β)** Μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (*Agropyron repens*), Άγρωστις (*Agrostis stolonifera*), Πάσπαλο (*Paspalum sp.*).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ● Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες σιτηρών. ● Μην χρησιμοποιείται άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του **ELEGANT 5 EC**.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα π.χ. αμειψισπορά κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του. **iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** 5 ημέρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Στα καλλωπιστικά συστήνεται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών για πιθανή φυτοτοξικότητα.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό/στρ. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Βαμβάκι, Σόγια: 90 ημέρες. Ζαχαρότευτλα: 60 ημέρες. Τομάτα (Υ), Πατάτα: 56 ημέρες. Σκόρδο, Κρεμμύδια: 55 ημέρες. Φασολάκια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό), Μπιζέλια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό), Όσπρια: Ρεβύθια, Φακή: 54 ημέρες. Ηλίανθος: 45 ημέρες. Φράουλα (Υ): 42 ημέρες. Μηλιά, Ροδακινιά-Νεκταρινιά: 35 ημέρες. Μηδική, Καπνός: 21 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

10/2026

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —