

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

(χημική ομάδα: Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα)



ELEGANT 5 EC

quizalofop-p-ethyl (κουιζαλοφόπ-π-εθύλ) 5% β/ο

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων

Πεδίο εφαρμογής: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά), ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Φράουλα), ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδια, Σκόρδο, τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς), ΟΣΠΡΙΑ (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια), ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια, Ηλιανθος, Βαμβάκι), ΠΑΤΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα, καπνός, Μηδική), ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μία (1).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 PSI (2-3 ατμ.). Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος και πρέπει να αποφεύγεται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Κολοκύθι: 7 ημέρες. Μηδική, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια: 21 ημέρες. Ηλιανθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα: 35 ημέρες. Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο: 49 ημέρες. Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά: 56 ημέρες. Ζαχαρότευτλα, Σόγια: 60 ημέρες. Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο: 70 ημέρες. Βαμβάκι: 80 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του απараβίαση συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και τη άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Συσκευασίες: 250ml / 500ml / 1LT / 3LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



103

10/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ELEGANT 5 EC

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά), ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Φράουλα), ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδια, Σκόρδο, τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς), ΟΣΠΡΙΑ (Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια), ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια, Ηλίανθος, Βαμβάκι), ΠΑΤΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα, καπνός, Μηδική), ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ.

Στόχοι-Δόσεις: Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Για Πολυετή ζιζάνια: 200-300 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ.

Χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδελφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μία (1).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: *Alopecurus* spp. (αλεπονουρές), *Apera spicaventi* (ανεμόχορτο), *Bromus* spp. (βρώμοι), *Dactylis* spp. (δακτυλίδες), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Eleusine indica* (ελευσίνη), *Hordeum* spp. (κριθάρια), *Lolium* spp. (ήρες), *Phalaris* spp. (φαλαρίδες), *Panicum* spp. (πάνικο), *Setaria* spp. (σετάριας), *Sorghum halepense* (βέλιουρας από σπόρο), *Triticum* spp. (σιτάρια).

Πολυετή ζιζάνια: *Agropyron repens* (αγρόπυρο),

Agrostis stolonifera (άγρωστις), *Cynodon dactylon* (αγριάδα), *Paspalum* spp. (πάσπαλο), *Sorghum halepense* (βέλιουρας από ριζώματα).

2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.

3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

4. Χρόνος εφαρμογής: Το *Cynodon dactylon* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15-20 εκατ. Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45-50 εκατ. Η *Poa annua* (ετήσια πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1-4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμμα.

5. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

6. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις): ● Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

● Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ● Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

● Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. ● Μην αυξάνετε τις δόσεις.

● Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό. ● Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. ● Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.



104

10/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —