

Deltamethrin (Ντελταμεθρίν) 2,5%
Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

Poleci® 2,5EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευρύ φάσμα δράσης (βλ. Ετικέτα).
- Δεν υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα.
- Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.
- Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια για πολλές καλλιέργειες του φάσματος δράσης (βλέπε τελευταία ασφαλή επέμβαση στην ετικέτα).
- Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των οργανοφωσφορικών, οπότε μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι-Σακχαρότευτλα-Κριθάρι-Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρεϊπ φρουτ-Νερατζιά-Αραβόσιτος-Σιτάρι: 30 ημέρες, Μηλιά-Αχλαδιά-Βερικοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Κερασιά, Δαμασκηνιά-Φύλλα Σέλινου-Αμπέλι-Ελιά-Κρεμμύδι-Λάχανο- Μπιζέλι-Πράσο-Πατάτα-Καπνός -Καρότο: 7 Φράουλα-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Μαρούλι-Μανιτάρια -Ρόκα -Αγκινάρα : 3 ημέρες, Ελαιοκράμβη, Σπαράγγι, Σόγια, Φασόλια, Κουκιά: καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10ml / 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1LT / 5LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



31

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

Poleci® 2,5EC

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ


Poleci 2,5 EC: Πυρεθροειδείς εντομοκτόνο επαφής στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μεγ. Αρ. εφαρμ. ανά καλλιερ. περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά):** i) Αφίδες με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάριο, Μύγα της Μεσογείου, Αλευρώδης με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά):** i) Αφίδες με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.ε. σκευ. σε 140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καρπόκαφα Καρυδιάς, Καρπόκαφα Καστανιάς με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **iii)** Ευρύτομο με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** i) Καρπόκαφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς, Ανθόμομος, Μηλολόνη, Κηκιδόμογες, Θρίπτες με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **iv)** Ψώρα Σαν Ζοσέ με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά των κινητών μορφών. **Κυδωνιά, Μουσμουλιά:** i) Καρπόκαφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς με 30-50* κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά):** i) Φυλλοδέτες, Ανάρσι με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέπια ή μύγα κερασιού με 40-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαφα της Δαμασκηλιάς με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **v)** Ψώρα Σαν Ζοσέ με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **Βυσσινιά:** i) Φυλλοδέτες, Ανάρσι με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέπια ή μύγα κερασιού με 40-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαφα της Δαμασκηλιάς με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Αμπέλι**:** i) Ευθεμίδα με 50 κ.ε. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.ε. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοχυλίδα με 50-70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκια, Αφίδες, Πυραλίδα, Τσιγαρολόγος, Κοφτοσκούληκα με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελιά:** i) Δάκος με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. ii) Λεκάριο, Θρίπτες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. iii) Βαμβακάδα με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. iv) Πυρηνότρυπες με 30 κ.ε. (ανθοβ.) ή 50 κ.ε. (καρποβ.) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.ε. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης (ανθοβία γενεά) και αμέσως μετά την καρποδέση (καρποβία γενεά) μεταξύ ωθισίας και εκκόλαψης των ωνών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Φράουλα:** Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο:** Αφίδες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σκόρδο:** Θρίπτες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 (Θ) κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες (Υ) και 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Τομάτα, Μελιτζάνα (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Θ) κ.ε. σκευ.

σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα με 30 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-42 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αγγούρι-Αγγουράκι-Κολοκυθάκι-Πεπόνι-Καρπούζι (Υ+Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.ε. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.ε. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο:** i) Πιερίδα, Μαμέστρα, Πλούζια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα, Αφίδες, με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα με 50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μαρούλι (Υ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μαϊντανός, Φύλλα Σέλινου, Ρόκα:** i) Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά):** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 25-30 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60). **Φακή, Ρεβίθια:** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Μπιζέλι:** i) Αφίδα των μπιζελιών, Σπίτονα με 25 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών, Κάμπιες, Θρίπτες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αγκινάρα:** i) Κασσιίδα με 50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Προντίνα, Αφίδες με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σπαράγγι:** Αφίδες, Θρίπτες με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μετά τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μανιτάρια:** Δίπτερα, Κολλέμβολα με 30-50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.ε. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Πατάτα:** i) Δορυφόρος με 50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Βαμβάκι:** i) Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι με 50-70 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης, Τζιτζικάκια με 50 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα, Αφίδα, Θρίπτες, Λύγκος, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Καπνός:** Αφίδες, Θρίπτες, Κοφτοσκούληκα, Επίτριξη με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελαιόκαρμυ:** Άλτης, Αφίδες, Σκαθάρι με 30 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60). **Σόγια:** i) Άλτης, Κοφτοσκούληκα, Νεζάρα με 30 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδες με 50 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60). **Ζαχαρότευλα, Παντζάρι:** i) Αφίδες, Μύγα των τεύλων, Άλτης, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σκαθάρι, Κλεονός, Κασσιίδα με 50 κ.ε. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Αραβόσποχος**:** i) Πυραλίδα, Σεξάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Διαβρωτικά με 50 κ.ε. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σιτάρι, Κριθάρι:** Αφίδες, Θρίπτες, Κοφτοσκούληκα με 25-30 κ.ε. σκευ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1-2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Βρώμη, Σίκαλη:** Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.ε. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **Μηδική:** Αφίδα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος με 25 κ.ε. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Καλλυπιαστικά (Υ+Θ):** i) Αφίδες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Μηλολόνη, Κάμπια γαρυφαλίου με 50 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-35 κ.ε. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 κ.ε. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.ε. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Παρατηρήσεις: *ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή (Κυδωνιά και Μουσμουλιά) η δόση των 50 κ.ε. σκευασματος/100 λίτρα ψ.υ. πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/στρέμ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.ε. σκευασματος στο στρέμμα. **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

***Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσποχο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia sp.* και *Sesamia sp.* παρασκαής του.



32

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —