



Paraffin oil
(Παραφίν όίλ) 83% β/ο ή 96,7% β/β
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

NITROPOL 97,6 EC

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση
σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Φάσμα δράσης:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηινιά)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Συνδυαστικότητα: ---.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Για όλες τις καλλιέργειες, καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100ml / 200ml / 500ml / 1LT / 5LT / 10LT / 20LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



53

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

NITROPOL 97,6 EC

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής - στόχοι - δόσεις - χρόνος εφαρμογής:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Πορτοκαλιά): **Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια και άλλες ψώρες.** Δόση: 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-2240 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.

Αλευρώδεις. Δόση: 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (500-2240 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): **Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες.** Δόση: 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. **Κόκκινος τετράνυχος.** Δόση: 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (940-1500 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή πριν την άνθηση.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): **Ψώρα Σαν-Ζοζέ και άλλες ψώρες.** Δόση: 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (600-1000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. **Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος.** Δόση: 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (940-1250 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή πριν την άνθηση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά): **100-220** για παρλατόρια, κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες, **50-220** για αλευρώδεις, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά): **80-100** για ψώρα Σαν-ζοζέ και άλλες ψώρες, **125-150** για κόκκινο τετράνυχος, **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά,

Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): **80-100** για ψώρα Σαν-ζοζέ και άλλες ψώρες, **125** για κόκκινο και κίτρινο τετράνυχος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες): **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Πορτοκαλιά): **1-2/ >60**, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά): **1**, **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): **1**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **1.** Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. **2.** Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ. **3.** Κατά τη χρήση του **NITROPOL 97,6 EC** τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. **4.** Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. **5.** Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32οC γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. **6.** Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. **7.** Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

