



PHOSTRICK Ca

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΣΒΕΤΣΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ (B/B): Φώσφορος (P_2O_5): 20%, Ασβέτσιος (CaO): 5%, Πηγή Φωσφόρου: Φωσφορώδες Οξύ.

pH: 1,7±0,5

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το PHOSTRICK Ca μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με διαφυλλικές εφαρμογές όσο και εφαρμογές στο έδαφος με τα συστήματα άρδευσης. Εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις βασικές λιπανσεις με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. Το ασβέτσιο έχει πολλαπλό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών καθώς είναι στοιχείο απαραίτητο στη διάίρεση των κυττάρων και την επιμήκυνση τους, στο σχηματισμό και την ανάπτυξη των νέων ριζών τριχιδίων, καθώς και στη δημιουργία συμπαγών κυτταρικών τοιχωμάτων. Ειδικότερα, η παρούσια των φωσφορώδων ιόντων στο παρασκεύασμα ευνοεί την καλύτερη κινητικότητα και αφομοίωση του ασβέτσιου από τα φυτά με αποτέλεσμα την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού (μέγεθος, χρώμα, σταθερότητα και μετασυλλεκτική ικανότητα αποθήκευσης).

Υψηλότερες αποδόσεις λόγω της αντιμετώπισης των πλέον συχνών ανωμαλιών που φυσιολογικά εμφανίζονται από την έλλειψη ασβετού ("ξηρή κορυφή") στην τομάτα, πιπεριά και μποτανικά και "bitter pit" στα μήλα).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Το PHOSTRICK Ca εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης, ως συμπληρωματική λίπανση, σε όλες τις καλλιέργειες. **Γενική δοσολογία:** Υδρολίπανση με 0,5-1 lt. / 1000m² ή διαφυλλικό φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό. **Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου** εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες. **Δενδρώδεις καλλιέργειες:** Ιη εφαρμογή στο στάδιο της βλαστοκής ανάπτυξης με 200 κ. εκ. / 100 lt. νερό και 2η εφαρμογή με την ίδια δοσολογία μετά την καρπόδεση ή υδρολιπάνσεις με 1 lt. / 1000m². **Κηπευτικά:** Διαφυλλικοί φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό πριν και μετά την βλαστοκής ανάπτυξης με 0,5-1 lt. / 1000m². **Καλλωπιστικά:** Διαφυλλικοί φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1 lt. / 1000m².

PHOSTRICK Cu

Το PHOSTRICK Cu είναι ένα υγρό λιπασμα που αποτελείται από άζωτο, φώσφορο και χαλκό.

ΣΥΝΘΕΣΗ (B/B): Άζωτο (N) αμμωνιακό: 10% ή 13%, Φώσφορος (P_2O_5): 22% ή 28%, Χαλκός (Cu): 4% ή 5.2% Πηγή Φωσφόρου: Φωσφορώδες Οξύ.

Εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος με τα συστήματα άρδευσης, ως συμπληρωματική της βασικής λιπανσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Γενική δοσολογία: Υδρολίπανση με 0,5-1 lt. / 1000m² ή διαφυλλικοί φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό. **Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου** εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες. **Δενδρώδεις καλλιέργειες:** Ιη εφαρμογή στο στάδιο της βλαστοκής ανάπτυξης με 200 κ. εκ. / 100 lt. νερό και 2η εφαρμογή με την ίδια δοσολογία μετά την καρπόδεση ή υδρολιπάνσεις με 1 lt. / 1000m². **Κηπευτικά:** Διαφυλλικοί φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό πριν και μετά την βλαστοκής ανάπτυξης με 0,5-1 lt. / 1000m². **Καλλωπιστικά:** Διαφυλλικοί φεκασμοί με 150-200 κ. εκ. / 100 lt. νερό ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1 lt. / 1000m².

PHOSTRICK Zn

Το PHOSTRICK Cu περιέχει άζωτο, φώσφορο και χαλκό.

ΣΥΝΘΕΣΗ (B/B): Άζωτο (N) ουρικό: 3%, Φώσφορος (P_2O_5): 33%, Ψευδάργυρος (Zn): 10%

Πηγή Φωσφόρου: Φωσφορώδες Οξύ. pH: 2,2- Αγωγιμότητα: 5,9 mS/cm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το PHOSTRICK Zn μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με διαφυλλικές εφαρμογές όσο και με ριζοποίησμα. Εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις βασικές λιπανσεις με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στα θρεπτικά συστατικά που περιέχει.

Ο φώσφορος αποτελεί πηγή ενέργειας για τα φυτά με τη μορφή του ATP και συμβάλλει στην δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος, στην πρωτότητα της παραγωγής και στον σχηματισμό των σπερματών των καρπών. Εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος με τα συστήματα άρδευσης. Ο Ψευδάργυρος υπεισέρχεται στους κύλους των υδατανθράκων στο κύτταρο και είναι ρυθμιστικός παράνοτας της αύξησης. Η έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά εκδηλώνεται με χλωρωτικά φαινόμενα και μείωση της ανάπτυξης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Το PHOSTRICK Zn εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης, ως συμπληρωματική λίπανση, σε όλες τις καλλιέργειες. **Κηπευτικά:** Διαφυλλικά. 200-250cc / 100 lt. Νερό. Ριζοπότισμα. 500cc -1000cc / στρέμμα. **Φρούτα-Δέντρα:** Διαφυλλικά. 200-250cc / 100 lt. Νερό. **Καλλωπιστικά φυτά:** Διαφυλλικά. 200-250cc/100lt. νερό. Ριζοπότισμα. 500-1000cc / στρέμμα.

Το PHOSTRICK Zn μπαίνει πρώτο στο φεκαστικό διάλυμα. Μπορεί να εφαρμοστεί με τα συνήθη αγροχημικά. Να μην αναμιγνύεται με αλακαλικά προϊόντα, συμπληρώματα, καθαριστικά και προϊόντα χαλκού. Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού να γίνεται προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση. Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Για φεκασμό στα θερμοκηπίανα εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις.

Η εταιρία NITROFARM ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

Δεν αποτελούν
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα



Συσκευασίες:
250ml, 1LT, 3LT, 20LT

ΣΕΛ. 25



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, OT20,
K35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —