

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
tebuconazole (τεμπουκοναζόλ) 25% β/ο
(ομάδα τριαζολών)

TEBÜ SÜPER 25 EW

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά), Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες), Σπαράγγι, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται. -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται. -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Συνδυαστικότητα: ---

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): ροδακινιά-νεκταρινιά: 7, αμπέλι: (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale: 28, σπαράγγι: Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Συσκευασίες: 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 750ml / 800ml / 1LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015




TEBÜ SÜPER 25 EW
Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
A.A.Δ.Α.: 60 599 / 10-1-2017
Εργασιμότητα (τεμπουκοναζόλ) 25% β/ο (ομάδα τριαζολών),
τεμπουκοναζόλ 25% β/ο (ομάδα τριαζολών),
75,4% β/β
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών),
με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων
(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο
δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της
απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προστα για πρόκληση βλάβης στο εύρωστο αναπνευστικό σύστημα.
- Τοξικό για ψάρια, υφρόβια, οργανισμούς με μεταβλητό βιολογικό κύκλο ζωής.
- Εξοδιστεί με τις κατάλληλες οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προσοχής για το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν οργανοφσφορικά ή οργανοχλωρίδια.
- Να φοράτε προστατευτικό γαντάκι προστατευτικά ενδύματα να φοράτε γάντια και προστατευτικά παπούτσια ενώ εργάζεστε με το προϊόν.
- Αποφύγετε να φάτε, να πιείτε ή καπνίζετε, όταν εργάζεστε με το προϊόν.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ζώων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ψαριών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των πουλιών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ορνίθων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των χοίρων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των κουνιών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των αρουρίων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των σπονδυλιτών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των αμφίβιων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των εντόμων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ακάρεων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των σπονδυλιτών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των αμφίβιων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ορνίθων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των χοίρων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των κουνιών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των αρουρίων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των σπονδυλιτών.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των αμφίβιων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των εντόμων.
- Αποφύγετε να εισαγάγετε το προϊόν στην τροφή των ακάρεων.

22 Θεσσαλονίκη, Free-phone: 800 11 820 820
info@nitrofarm.gr url: www.nitrofarm.gr



93

05/2020

www.nitrofarm.gr

info@nitrofarm.gr

Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά):

Για i) Ωϊδιο (*Sphaerotheca pannosa*) με 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-110 κ.εκ. σε 120-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα,

ii) Μονίλια καρπών (*Monilinia laxa*) με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-110 κ.εκ. σε 120-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή 1 εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες):

Για Ωϊδιο (*Uncinula necator*) με 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές/14-21 ημέρες λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής.

Σπαράγγι: Για Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*) με 100 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale:

Για Ελμινθοσπορίωση (*Pyrenophora teres.*), Σεπτορίωση (*Septoria spp., Leptosphaeria nodorum*) με 100 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης.

