



ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ - ΘΕΙΟΥ

TRE SOLI



ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β):
10% Ασβέστιο (CaO)
20% ΘΕΙΟ (SO3)



Ενδείκνυται και για άλλες καλλιέργειες, μετά από εδαφολογικές αναλύσεις, και κατόπιν συστάσεως του γεωπόνου.

Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 2 έτη υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και λάδια. Ελάχιστη απόσταση εφαρμογής 20 ημέρες. Δεν συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνδυάζεται με πυρεθρίνες. Οι θερινοί ψεκάσμοι να γίνονται αργά το απόγευμα προς βράδυ. Το προϊόν είναι σε γρήγη μορφή και μπορεί να συνδυαστεί αποκλειστικά με παρόμοιας μορφής λιπάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Γεμίστε το δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα του προϊόντος και συμπληρώστε το υπόλοιπο με νερό

Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος. Να αποφεύγονται οι χαμηλές θερμοκρασίες φύλαξης και ο μεγάλος χρόνος αποθήκευσης καθώς επίσης και η απευθείας έκθεση του προϊόντος σε θερμοκρασίες άνω των 28°C.

ΔΡΑΣΗ:

Το **ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ** ενισχύει την αντοχή των δένδρων και καρπών από παρασιτικές ασθένειες. Βελτιώνει την ποιότητα (σκληρότητα, χρώμα, μέγεθος) και διατηρησιμότητα των καρπών ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί τους μηχανισμούς των φυτών. Προσοχή στις δοσολογίες μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα. Εφαρμογή κατά τις απογευματινές ώρες. Μετά την εφαρμογή του θειασβεστίου πρέπει να μεσολαβούν 20 ημέρες για την εφαρμογή λαδιού κλπ. Μην ψεκάζεται όταν τα δένδρα ή η καλλιέργεια είναι σε κακουχία ή μια γενικότερη αδυναμία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Ελιά: Οκτώβριο (μετά τη συγκομιδή) 20lt /1000lt νερό. Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 20lt /1000lt νερό. Μάρτιο-Απρίλιο 15lt/1000lt νερό. Ιούνιο-Ιούλιο 10lt/1000lt νερό.

Αμπέλι: Πριν το κλάδεμα 20-40lt/1000lt νερό. Μετά το κλάδεμα 20lt/1000lt νερό. Άνοιξη-καλοκαίρι έως και 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή (3-4 εφαρμογές/30 ημέρες) 10lt/1000lt νερό.

Μήλο, αχλάδι, ροδάκινο, κεράσι, βερίκοκο, δαμάσκηνο, αμύγδαλο: Οκτώβριο-Δεκέμβριο (στην πρώτη πτώση των φύλλων) 20lt/1000lt νερό. Ιανουάριο-Φεβρουάριο (λήθαργο) 40 lt/1000lt νερό. Φούσκωμα οφθαλμών (πριν την έκπτυξη των φύλλων) 20lt/1000lt νερό. Ροζ μπουμπούκι (πριν την ανθοφορία): 10lt/1000lt νερό. Πτώση πετάλων και κάθε 25 ημέρες 10 lt/1000lt νερό.

Τομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, κολοκύθι, αγγούρι, καρπούζι, πεπόνι, βαμβάκι, ανθοκομία: Σε όλη τη καλλιεργητική περίοδο 10lt/1000lt νερό.

Ακτινίδιο: Μετά τη συγκομιδή 20lt/1000lt νερό. Φεβρουάριο (λήθαργο) 30-40lt/1000lt νερό. Τέλη Απριλίου (ανά 20 ημέρες 3-4 εφαρμογές) 10lt/1000lt νερό.

Σπαράγγι: Φθινόπωρο (στο θέρισμα καλλιέργειας) 40lt/1000lt νερό. Όταν βγει η καλλιέργεια (3 εφαρμογές/25 ημέρες) 10lt/1000lt νερό.



Δεν αποτελεί φυτοπροστατευτικό προϊόν

κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. ΕΚ 843/2018 & 1163/2021



Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

ΣΕΛ. 13



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —