



Folpet (φολπέτ) 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

FOLLOW 80 WG

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση, κατά ευρέος φάσματος μυκητολογικών ασθενειών. Δρα σε πολλαπλά σημεία. Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη του μυκηλίου, μέσω πολλαπλής δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο (αναστέλλει την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταροδιαίρεση).



Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής - Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) με 120-187,5 γρ. σκευ. max./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 187,5 γρ. σκευ. max. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 8 εφαρμογές/10-14 ημέρες. **i) Για Φόμοψη** (*Phomopsis viticola*): Εφαρμογές που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα συμπτώματα, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. **ii) Για Περονόσπορο** (*Plasmopara viticola*)**:** 1η εφαρμογή: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ., 2η: Μετά από 10 ημέρες, 3η: Λίγο πριν την άνθηση, 4η: Λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **iii) Για Βοτρύτη** (*Botrytis cinereal*), **Μαύρη σήψη** (*Guignardia bidwellii, Coniella diplodiella*): 1η εφαρμογή: Τέλος της άνθησης, 2η: Αρχή της καρπόδεσης, 3η: Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, 4η: Αρχή ωρίμανσης.
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): Για Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) με 150 γρ. σκευ. max./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκευ. max. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης, μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών (BBCH 14-79).
Τομάτα (Θ): Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) με 150 γρ. σκευ. max./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκευ. max. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71).
Τομάτα (Υ): Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) με 100 γρ. σκευ. max./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ. σκευ. max. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71).
Γαρυφαλλιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)*: Για Αλτερναρίωση (*Alternaria sp.*) με 125-150 γρ. σκευ. max./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-100 γρ. σκευ. max. σε 150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 5 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών .
Παρατηρήσεις: Εφαρμόζεται προληπτικά. ***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της γαρυφαλλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.***
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το **FOLLOW 80 WG** έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. folpet, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά FRAC.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Οι εργάτες να μην εισέρχονται για εργασίες στον αγρό για 24 ημέρες μετά τον ψεκασμό, στην καλλιέργεια της γαρυφαλλιάς.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματοςστο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποιήση της συσκευασίας.
Συνδυαστικότητα: ---.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στο αμπέλι στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 28. Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 56. Τομάτα (Θ+Α): 7. Γαρυφαλλιά: Δεν εφαρμόζεται.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό χώρο και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

11/2026

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη
NitroFarm
— από το 1976 —