



Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: FENFEN 24 EC)
oxyfluorfen 24% β/ο • Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Μεγάλο φάσμα δράσης (χρήση και σε δενδρώδεις και σε εκατικές καλλιέργειες (βλ. ετικέτα).

Καταπολεμάει και πλατύφυλλα και αγροστώδη ζιζάνια (βλ. ετικέτα).

Μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας, σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικής ομάδας δράσης κατά HRAC.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο, αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.

Συσκευασίες:

1. Φιάλη 60 κ.εκ. έως 1 λίτρο. Πλαστικό τύπου COEX (PE/EVOH).
2. Φιάλη μέσα σε κουτί 60 κ.εκ. έως 600 κ.εκ. Πλαστικό τύπου COEX (PE/EVOH).
3. Δοχεία 1 λίτρο έως 25 λίτρα. Πλαστικό τύπου COEX (PE/EVOH).

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



105

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr




Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Φάσμα δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο):

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. Συνιστάται η εφαρμογή αρχές της Άνοιξης σε ποικιλίες μανταρινιάς και σε πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και το φθινόπωρο σε όψιμες ποικιλίες μανταρινιάς και πορτοκαλιάς (Navel),

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα):

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήθαργο,

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά):

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήθαργο,

Ελιά: Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το φθινόπωρο Χειμώνα κατά την διάρκεια ωρίμανσης των καρπών με παρουσία ή μη ελιών στο έδαφος,

Αμπέλι (Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια):

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το φθινόπωρο.

Στόχος:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. **Δόσεις σκευάσματος:** 60 κ. εκ. / στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.
2. Η συνολική ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ.
3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
4. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
5. Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω ξηρασίας, όταν αναμένεται βροχή και όταν φυσάει.
7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
8. **α) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), *Diploaxis erucoides*, Αγριοβρώμη (*Avena sterilis*). Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Τριβόλι (*Tribulus terrestris*), Οξαλίδα (*Oxalis acetosella*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*).



106

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —