

fluometuron (φλουομετουρόν) 50% β/ο
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

BOOST

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι Για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, με 250-400 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-40.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά (BBCH 00-09).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος: 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά, με ακροφύσιο τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: ---.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χηρήσεις (ημέρες): BAMBAKI --- (εφαρμογή προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά, BBCH 00-09).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν μπιζέλια, μετά από άρωση σε βάθος 20 εκατοστών. -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φτευτούν, μετά από άρωση σε βάθος 20 εκατοστών οι εξής καλλιέργειες: -ηλιανθος μετά την παρέλευση 200 ημερών, -βρώμη μετά την παρέλευση 250 ημερών, -κρεμμύδι μετά την παρέλευση 485 ημερών, -τομάτα μετά την παρέλευση 635 ημερών, -σινάπι μετά την παρέλευση 730 ημερών. -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαράβατη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Συσκευασίες: 500ml / 1LT / 5LT / 10LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδύνατο. Σηκάνετε το σώμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΗΣΗΣ ή ΠΙΝΟΥΣΤΗΣ ελέγξτε: Συμπτώματα / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός ζητήστε αμέσως συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Σπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παύοντα στον καθαρό αέρα. **ΑΝΤΙΔΟΤΑ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ:** 210 7733777

Εφαρμόστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικό ενδύμα / πρόσωπο. Φοράτε γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη συντήρηση / φύλαξη και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαναόδου μετά τον εκκαθάριση ερεθισμάτων πρέπει να φοράτε γάντια, προστατευτικό ποικύμα και μακρι παντελόνι. Όταν η καλλιέργεια γεννηθεί με καταμνηστική προσην, να αφιερώσει ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. Διότιση προσιμωμένη/πρόσφατη σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία. Μη ρομπάτε το νερό με το ακαθάριστο ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τα φυτά μη εισπνεύστε το αέρας με μια ασφαλή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική ή μη ασφαλή ζώνη προστασίας 1 μέτρο από μη γεωργική ή σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Κάτοχος της οδού: Sharada Cropchem España S.L., Edificio Alajaltes Business Center, Carril Condemina nº 3, 12th Floor, 50008 Madrid (Iberrola) Elena Nieto, Tel. +34 888127589, e-mail: e.nieto@shardantl.com, regn@shardantl.com


Αρ. Πρωτόκολλο: Ημερ. Παρασκευής: Ημερ. Λήξης: Βλέπε επί της συσκευασίας


111

05/2020

 www.nitrofarm.gr

 info@nitrofarm.gr

 Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —

BOOST

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις:

Βαμβάκι (GOSSS): Για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, με 250-400 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού

(λίτρα/στρέμμα):

30-40.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά (BBCH 00-09).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος:

1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.

2) Σε 7-10 μέρες από την εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να 'ενεργοποιηθεί' το fluometuron.

3) Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus sp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Χαμομήλι (*Matricaria recutita*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Γλιστρίδα ή Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Λάπαθο (*Rumex spp*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Σετάρια (*Setaria sp.*)

112

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

