



# CRATE

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: CARNADINE)  
acetamiprid (ασεταμιπρίντ) 20% • Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικωτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου (βλ. ετικέτα).

Μετά την απαγόρευση χρήσης των νεονικωτινοειδών (imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) σε καλλιέργειες υπαίθρου, το CRATE είναι πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των παραγωγών για την αντιμετώπιση των αφίδων και άλλων εντόμων.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας. -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες δόσεις.

Χαμηλής υπολειμματικής διάρκειας σε τομάτες (Θ), μελιτζάνες (Θ) και κερασιά.

Συσκευασίες:

Φιάλες/δοχεία HDPE μεγέθους 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500, 600, 900 κ. εκ, 1 λίτρου, 50 και 10 λίτρων.

**ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

**ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.**

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



11

05/2020



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —

# CRA TE

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

**Πεδίο Εφαρμογής Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:**

**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιφφρουτ, Φράπα, Λάιμ, Κουμ κουάτ):** Για **i)** Φυλλοκνίστη με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαμβακιού, Μαύρη αφίδα με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σε 60-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια, Ψευδόκοκκο με 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 κ.εκ. σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 30 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** **α) Για i)** Φυλλορύκτες με 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Πράσινη αφίδα με 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Ρόδινη αφίδα, Αφίδα αχλαδιού με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iv)** Οπλοκάμνη με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **β)** Για Καρπόκαψα με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 8 ημέρες μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

**Ροδακινιά, Βερικοκιά:** **α) Για i)** Πράσινη αφίδα, Φυλλορύκτες, Τζιτζικάκια με 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αφίδες με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **iii)** Θρίπες με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **β)** Για Καρπόκαψα, Ανάρσια με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 20 ημέρες μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

**Δαμασκηλιά:** **i)** Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής. **ii)** Για Καρπόκαψα με 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 20 ημέρες μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

**Κερασιά:** Για **i)** Ραγολέτις με 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Μαύρη αφίδα με 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Ελιά:** **i)** Για Πυρηνοτρήτη με 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 2 ψεκασμοί καλύψεως ανά 14 ημέρες εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών

προειδοποιήσεων. **ii)** Για Δάκο με 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 2 ψεκασμοί καλύψεως ανά 14 ημέρες σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.

**Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο):** **i)** Για Τζιτζικάκια με 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σε 20-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ii)** Ευδεμίδα με 35-45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις.

**Βαμβάκι:** Για Αφίδες, Καφέ Βρωμούσα (Χρήση ήσσονος σημασίας)\* με 20 κ.εκ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf), Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι:** Για **i)** Αφίδες με 25-35 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** *Macrosiphum euthorbiae*, *Myzus persicae* με 20-25 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.

**Πατάτα:** Για **i)** Δορυφόρο με 10-15 κ.εκ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αφίδες με 20 κ.εκ. σε 30-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Πιπεριά (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ), Τομάτα (Y+Θ):** Για **i)** Πράσινη αφίδα με 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20-25 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Αλευρώδεις με 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 20 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**Κουνουπίδι (Y), Μπρόκολο (Y), Λάχανο (Y):** Για Πλουτέλλα με 25-35 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.

**Ελαιοκράμβη:** Για **i)** Αφίδες με 25 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, **ii)** Σκαθάρι της γύρης με 30 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** **1.** Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. **2.** Ψεκάzte κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση. **3.** Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ./100 λιτ.ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. \*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.»



12

05/2020



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —