

ABYSS

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: ADMIRAL 10 EC)
pyriproxifen (πυριπροξιφέν) 10%, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων.

Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη,) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Επιδρά επίσης και στα ακμαία, καθώς έχει στείρωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών.

Είναι δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.

Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποσή.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Καταπολεμά επίσης και το έντομο *Marcallina hellenica* στα πεύκα αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκάσει με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι, φράουλα.

Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των οργανοφωσφορικών, πυρεθροειδών και καρβαμικών (ανήκει στα παράγωγα της πυριδινίλης), οπότε μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συσκευασίες:

Φιάλες COEX μεγέθους 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 700 κ.εκ. και 1 λίτρο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



3

01/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ABYSS

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερ. Περίοδο:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Φράπα, Γκρεϊπ-φρουτ, Άλλα είδη): Για Κοκκοειδή με 35-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 225 κ.εκ. (μέγιστο) σε 200-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), Βερικοκιά, Κερασιά, Άλλα είδη πυρηνοκάρπων, Χρήσεις ήσσονος σημασίας ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά): Για Κοκκοειδή με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά: Για Κοκκοειδή με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
Ελιά: Για Λεκάριο, Χρήση Ήσσονος Σημασίας *Euphyllura olivina* με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς⁽³⁾.
Αμπέλι: Για Κοκκοειδή με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 κ.εκ. (μέγιστο) σε 40-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
Τομάτα, Μελιτζάνα υπαίθρου & θερμοκηπίου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι θερμοκηπίου: Για Αλευρώδεις με 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 (1) εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων⁽²⁾.
Φράουλα θερμοκηπίου: Για Αλευρώδεις με 25-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 8 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων⁽²⁾.
Βαμβάκι: Για Αλευρώδεις βλέπε δόση ανά στρέμμα. 50 κ.εκ. (μέγιστο) σε 40-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν το άνοιγμα των καρυδίων και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων.
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα), Τριανταφυλλιά, Δέντρα, θάμνοι: Για Κοκκοειδή με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα), Τριανταφυλλιά, Δέντρα, θάμνοι: Για Αλευρώδεις με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων⁽²⁾.
ΠΕΥΚΑ⁴ αστικών και περιαστικών περιοχών: Για *Marchalina hellenica* με 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με καλή διαβροχή. 1 εφαρμογή (με την προϋπόθεση ότι τη ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.) όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών⁽⁴⁾.
Παρατηρήσεις: 1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη. 2. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρώδων είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του **ABYSS**. 3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae*. 4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί: ● Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας. ● Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchallina hellenica* μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου. ● Περιορισμοί προφυλάξεις: Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό. Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων. Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchallina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται: **α.** Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του. **β.** Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους. **5.** Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της καρυδιάς, της φιστικιάς και της καστανιάς, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις συγκεκριμένες καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **6.** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Euphyllura olivina* στην καλλιέργεια της ελιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.

