

MEDAS MAX SG

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Προϊόν αναφοράς: PROFIL 20 SG)
acetamiprid (ασεταμπρίντ) 20% ● Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις, και ορισμένα Λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (*Phyllocnistis citri*) (βλ. ετικέτα).

Μετά την απαγόρευση χρήσης άλλων νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων σε καλλιέργειες υπαίθρου, το MEDAS MAX SG αναμένεται να αποτελέσει πολύ σημαντικό όπλο στη φάρετρα των παραγωγών για την αντιμετώπιση των αφίδων και άλλων εντόμων.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυστηματικές χρήσεις (ημέρες): Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρέιφ φρουτ, Κιτριά, Μήλα, Αχλάδια, Κεράσια, Δαμάσκηνα, Βαμβάκι, Καπνός, Μηδική: 14. Ροδάκινα, Νεκταρίνια: 30. Τομάτες (Υ), Πιπεριές (Υ), Μελιτζάνες (Υ): 7. Τομάτες (Θ): 14. Μελιτζάνες (Θ): 3. Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο φλοιό): Αγγούρι (Θ): 7. Κολοκυνθοειδή (με μη-εδώδιμο φλοιό): Πεπόνι (Υ): 14. Πατάτες: 7.

Συσσκευασίες:

-Είδος: Σακούλα μέσα σε κουτί. -Μέγεθος: 10, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 600 γρ., 1 κιλό, 1,2 κιλά. -Υλικό: Σακούλα Laminate (PET/AL/PE), κουτί χάρτινο.


ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



19

06/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

MEDAS MAX SG

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή (Φυτώρια) Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά: i) Για Αφίδες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-25 γρ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. ii) Για Φυλλοκνίστη με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-25 γρ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί κυρίως στην νέα βλάστηση το καλοκαίρι με την έναρξη της προσβολής. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ φρουτ, Κιτριά): Για Αφίδες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 γρ. σε 200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής νωρίς την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διόγκωση των οφθαλμών έως την πτώση των πετάλων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 1 εφαρμογή.

Κερασιά: Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-37,5 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Δαμασκηνιά: Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Α): Για Αφίδες με 25 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Τομάτες (Θ): Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες.

Μελιτζάνες (Θ): i) Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις με 35-40 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την

έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) Πεπόνι (Υ): i) Για Αφίδες με 12,5-15 γρ. σε 50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις με 20-25 γρ. σε 50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής (BBCH 51-87). 2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) Αγγούρι (Θ): i) Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Βαμβάκι: i) Για Αφίδες με 20-25 γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις, Καφέ Βρωμούσα (Χρήση ήσσονος σημασίας)* με 25-30 γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Καπνός: Για Αφίδες, Αλευρώδεις με 25-30 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Πατάτα: i) Για Δορυφόρο με 12,5 γρ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αφίδες με 20 γρ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Μηδική: Για Αφίδες με 7,5-10 γρ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

Καλλωπιστικά: i) Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις, Δευτερεύουσα δράση κατά του Θρίπα με 35-40 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής (BBCH 40-89). 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού. 2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».



20

06/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —