

Deltamethrin (Δελταμεθρίν): 2,5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΕΡΟΣ-ΕΙ

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτακτικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: -----

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: =Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διατηρείστε το στην αρχική, απαρβίαση συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40oC. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10ml / 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1LT / 5LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



15

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχοι-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μεγ. Αρ. εφαρμ. ανά καλλιερ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες): Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεροτζιά): i) Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάριο, Μύγα Μεσογείου, Αλευρώδης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** i) Καρπόκαμα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα, Ανθονόμος, Μηλολόνη, Κηδικομύγες, Θρίπτες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **iv) Ψώρα Σαν Ζοσέ** με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά):** i) Φυλλοδέτες, Ανάρσια με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέτιδα ή μύγα κερασιά με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαμα Δαμασκηλιάς με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **v) Ψώρα Σαν Ζοσέ** με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **Αμπέλι*:** i) Ευδεμίδα με 50 κ.εκ. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κογχυλίδα με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκια, Αφίδες, Πυραλίδα, Τσιγαρολόγος, Κοφτοσκουλήκα με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελιά:** i) Δάκος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. ii) Λεκάριο, Θρίπτες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. iii) Πυρηνοτρίτης με 30 κ.εκ. (ανθοβ.) ή 50 κ.εκ. (καρποβ.) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή την έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενιά) και αμέσως μετά την καρποδίαση (καρπόβια γενιά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Φράουλα:** Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο:** Αφίδες, Θρίπας, Αλευρώδης, Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 (Θ) κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκουλήκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες (Υ) και 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Τομάτα, Μελιτζάνα (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Υ) και 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αγγούρι (Υ+Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκουλήκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Λάχανο:** i) Πιερίδα, Μαμέστρα,

Πλούζια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκουλήκα, Αφίδες, με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μαρούλι (Υ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Φύλλο Σέλινου, Ρόκα:** i) Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μπιζέλι:** i) Αφίδα των μπιζελιών, Σιτόνα με 25 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών, Κάμπιες, Θρίπας, Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά):** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκουλήκα με 25-30 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης. **Αγκινάρα:** i) Κασσιίδα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Προντένια, Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σπαράγγι:** Αφίδες, Θρίπας με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μετά τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μανιτάρια:** Δίπτερα, Κολλεμβόλα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Πατάτα:** i) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Βαμβάκι:** i) Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Τζιτζικάκια με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα, Θρίπας, Λύγκος, Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελαιοκράμβη:** Άλτης, Αφίδες, Σκαθάρι με 30 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης. **Σόγια:** i) Άλτης, Κοφτοσκουλήκα, Νεζάρα με 30 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης. **Ζαχαρότευλα:** i) Άλτης, Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σκαθάρι, Κλεονός με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Καπνός:** Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκουλήκα, Επίτριξ με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αραβόσιτος**:** i) Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκουλήκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Διαβρωτικά με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σιτάρι, Κριθάρι:** Αφίδες, Θρίπας, Κοφτοσκουλήκα με 25-30 κ.εκ. σκευ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1-2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Καλλωπιστικά (Υ+Θ, Φυτώρια):** i) Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Μηλολόνη, Κάμπια γαρυφαλού με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-35 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδεις με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: *Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφύλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το ΕΡΟΣ-ΦΙ. **Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίτευτων των μικοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.* σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

