



PONANT

70 SG

Dicamba 70% (β/β)
σε μορφή άλατος
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

Μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας, σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικής ομάδας δράσης κατά HRAC.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο, αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (6 ώρες).

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας.

Δεν απαιτείται η τήρηση ζώνης προστασίας για τα μη στοχευμένα αρθρόποδα.

Σύμφωνα με την έγκρισή του δεν έχει σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.

Συσκευασίες:

Φιάλη ή Δοχείο 40 γρ., 80 γρ., 200 γρ. 400 γρ., 800 γρ, 1 και 1,5 κιλού HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). Δοχείο 1,5 κιλού, 2, 4, 5, 8 και 10 κιλών HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015




123

05/2020

 www.nitrofarm.gr

 info@nitrofarm.gr

 Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		Γραμ./στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αραβόσιτος	Πλατύφυλλα ζιζάνια (4)	40	20	Μεταφυτρωτικός ψεκασμός στο στάδιο των 2-6 φύλλων της καλλιέργειας	1

Παρατηρήσεις:

- Αποφεύγετε την εφαρμογή του σκευάσματος σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες (ξηρασία, έλλειψη υγρασίας, ακραίες θερμοκρασίες) και όταν η θερμοκρασία είναι ≥ 30 °C.
- Μην ψεκάσετε όταν φυσάει και όταν αναμένεται βροχή σε διάστημα 6 ωρών από την εφαρμογή.
- Αποφεύγετε την διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες όπως βαμβάκι, μηδική, τεύτλα, ηλιάνθος, μπιζέλια, ελαιοκράμβη, πατάτα, φασόλια, σόγια, καπνό, καλλωπιστικά και ανθοκομικά φυτά, κηπευτικά, αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα.
- Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα Ζιζάνια

Amaranthus retroflexus (Βλήτο)
Chenopodium album (Ψουβουδιά)
Polygonum convolvulus (Πολύγωνο)
Lamium purpureum (Ψάμιο πορφυρό)
Viola arvensis (Αγριομενεξές)
Solanum nigrum (Αγριοτοματιά)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Polygonum aviculare (Πολυκόμπι)

