



Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
S-metolachlor (Σ-μετολαχλώρ) 96% (β/ο)

TOTAL

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το S-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεότυλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια, παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Αραβόσιτος: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκάστρα υψηλού όγκου και ψεκάστικό υγρό 20-60 λίτρα ανά στρέμμα.
Συνδυαστικότητα: --.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στον ίδιο αγρό, να μη σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκάστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (Νωρίς, μεταφωτρωτικά).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ήλιο και υγρασία.

Συσκευασίες: 250ml / 500ml / 1LT / 5LT


ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



125

05/2020

www.nitrofarm.gr

info@nitrofarm.gr

Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΤΟΤΑΛ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		Κ.εκ./ στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια	130	20 – 60	Προφυτρωτικά (αμέσως μετά τη σπορά) και πριν να φυτρώσουν τα ζιζάνια BBCH 00-07	1 εφαρμογή κάθε 3 χρόνια
				Νωρίς μεταφυτρωτικά, έως τα 4 φύλλα της καλλιέργειας και πριν να φυτρώσουν τα ζιζάνια BBCH 00-14	

Παρατηρήσεις: i) Εάν δε βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή, να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. ii) Κατά τον ψεκάσμο να αποφεύγετε η μεταφορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.

iii) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Προφυτρωτικά: Ευαίσθητα ζιζάνια: **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*), **Αιματόχορτο** (*Digitaria sp*), **Μουχρίτσα** (*Echinochloa crus-galli*), **Ήρες** (*Lolium spp*), **Πόα** (*Poa annua*), **Σετάρια** (*Setaria spp.*), **Άγριο σιτάρι** (*Triticum sp*), **Βλήτα** (*Amaranthus spp.*), **Αναγαλλίδα** (*Anagallis foemina*), **Καφέλλα** (*Capsella bursa-pastoris*), **Λουβουδιά** (*Chenopodium album*), **Τάτουλας** (*Datura stramonium*), **Καπνόχορτο** (*Fumaria officinalis*), **Χαμομήλι** (*Matricaria sp.*), **Γλυστρίδα** (*Portulaca oleracea*), **Αγριοτοματιά** (*Solanum nigrum*), **Στελλάρια** (*Stellaria media*).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: **Κίτρινη κύπερη** (*Cyperus esculentus*), **Αγριοπιπεριά** (*Polygonum persicaria*).

Μεταφυτρωτικά: **Βλήτα** (*Amaranthus spp.*), **Λουβουδιά** (*Chenopodium album*), **Μουχρίτσα** (*Echinochloa crus-galli*), **Σετάρια** (*Setaria spp.*).

126

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

