




1-naphthylacetic acid
(1-ναφθυλασέτικ άσιντ) 1% β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)

MONEX

Ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών, για την πρόληψη και τον περιορισμό της καρπόπτωσης καθώς και για το ελεγχόμενο αραίωμα των καρπών σε μηλιές.





Βιολύτιο σκόνη (WP)

Αριθμός Άδειας Διαθέσεως στην Αγορά (ΑΔΑΔ): 8298-08-00-2002
Συνιστώμενη δόση: 100 γρ./100 λίτρα νερού (100-150 γρ./100 λίτρα νερού σε 15-25°C)

Ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών, για την πρόληψη και τον περιορισμό της καρπόπτωσης καθώς και για το ελεγχόμενο αραίωμα των καρπών σε μηλιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέξτε να φοράτε κατάλληλα ρούχα κατά τη χρήση.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα ζώα.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα υδατικά σώματα.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα φυτά που δεν είναι ο στόχος της εφαρμογής.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα υδατικά σώματα.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα υδατικά σώματα.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 Κιλό (Kg)

NitroFarm
— από το 1976 —
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 800 11 820 820, Fax: 210 5533547, Email: info@nitrofarm.gr, www.nitrofarm.gr

Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα:

Μηλιά: i) Για αραίωμα καρπών με 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή μετά την καρπόδεση και μέχρι οι καρποί να είναι έως 20 χιλιοστά (BBCH 71-72).

ii) Για περιορισμό καρπόπτωσης με 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 2 εφαρμογές/10 ημέρες όταν οι καρποί έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους και μέχρι να είναι ώριμοι για συγκομιδή (BBCH 79-87).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Συνιστάται οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας, το πρωί ή κατά προτίμηση το βράδυ (όχι σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 10°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25°C.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην

οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μηλιά (Αραίωμα καρπών): --. Μηλιά (Περιορισμός καρπόπτωσης): 7 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1Kg

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία NITROFARM ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

06/2020