




ΑΑΓΩ

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: BELPROMEC 1,8 EC)
abamectin (αμπαμέκτιν) 1,8% • Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής, με διελασματική δράση κατά κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα και στα ακάρεα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.



Φάσμα δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος, Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο, Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Φράουλα (Θ): i) Κίτρινος τετράνυχος, *Phytonemus pallidus*, 15-100 κ.εκ./στρ., 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. ii) Λιριόμυζα, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

Τομάτα (Θ): i) Κίτρινος τετράνυχος, *Eryophyidae (Aculops lycopersici)*, *Polyphagotarsonemus latus*, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. ii) Λιριόμυζα, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με τη πρώτη ωοτοκία. iii) Tuta absoluta, 100 κ.εκ./στρ, 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 100 λίτρα/στρ. 1-3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

Μελιτζάνα (Θ): Κίτρινος τετράνυχος, 15-80 κ.εκ./στρ, 50-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.

Κολοκύθι (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ): i) Κίτρινος τετράνυχος, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. ii) Λιριόμυζα, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την πρώτη ωοτοκία.

Καλλωπιστικά και ανθοκομικά (Θ): Τετράνυχος, 15-100 κ.εκ./στρ, 50-100 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, 30-100 λίτρα/στρ. 1-3 εφαρμογές ανά 15 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες θερμοκηπίου: Κολοκύθι, Αγγούρι, Αγγουράκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Φράουλα, κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μην το χρησιμοποιείτε πάνω από δυο συνεχόμενες εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---, -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:---, -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Φράουλες (Θ), Τομάτες (Θ), Μελιτζάνες (Θ), Κολοκύθα (Θ), Αγγούρια (Θ), Αγγουράκια (Θ), Πεπόνια (Θ), Καρπούζια (Θ), Κολοκύθες (Θ): 3.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΝΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

32

01/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —