



Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
Oxyfluorfen (Οξυφλουορφέν) 24 % β/ο

NEO

IPPEAS

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκάσμο κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.



Στόχος: Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*.
Πεδίο Εφαρμογής-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο), Ελιά με 62,5 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης και όχι μετά τις 30 Απριλίου.
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα), Αμπέλι (Οινοποίηση, Επιτραπέζια) με 62,5 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκάσμος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόσετε το σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σταθούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες: - τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών). - κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών). - ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών). iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης.

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σταθούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες: - τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών). - κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών). - ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών). iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Εφαρμόζεται με ψεκάσμο κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. 2. Η συνολική ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σταθούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες: - τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών). - κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών). - ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών). iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Βλήτα (*Amaranthus blitoides*), (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*, *Convolvulus althaeoides*), (*Diploxis erucoides*, *Diploxis muralis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αναρριχώμενο πολίσσυνο (*Fallopia convolvulus*), Ήρες (*Lolium multiflorum subsp. gaudini*), (*Lolium rigidum*), Μολόχα (*Malva sylvestris*), Κοινή πόα (*Poa annua*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*).
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Ζοχός (*Sonchus sp.*).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει oxyfluorfen, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα E κατά HRAC. Για την

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σταθούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες: - τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλα μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών). - κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών (1680 ημερών). - ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών). iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250cc / 500cc / 1LT / 5LT



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΟΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

125

03/2022



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —