



Οxamyl (Οξαμίλ) 10% (χημική ομάδα καρβαμιδικών)

NEMADATE 10 SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ. Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης. Απορροφάται από τις ρίζες των φυτών, μεταφέρεται στο φύλλωμα και έχει δευτερεύουσα δράση κατά εντόμων φυλλώματος.

Δρα στο νευρικό σύστημα, λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας. Να γίνεται εναλλαγή εφαρμογών με νηματώδοκτονα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Φάσμα Δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος (λίτρα σκ./στρέμμα) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου), Πιπεριά (θερμοκηπίου), Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου) με 1 λίτρο σκ./στρέμμα. Για Νηματώδεις (*Meloidogyne Spp.*, *Ditylenchus spp.*), 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης κατά τη φύτευση ή μεταφύτευση των φυτών. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στο σύστημα άρδευσης και η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται λίγο πριν το τέλος της προγραμματισμένης άρδευσης.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3 εφαρμογές ανά 20 ημέρες για όλες τις καλλιεργείες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (θερμοκηπίου), Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): 21 ημερες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



NEMADATE 10 SL Εγγυημένη σύνθεση: Οxamyl 10% βιο Βοηθητικές ουσίες 90,18% βιο Πυκνό διάλυμα (SL) Οxamyl (Οξαμίλ) 10% (χημική ομάδα καρβαμιδικών)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ. Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης. Απορροφάται από τις ρίζες των φυτών, μεταφέρεται στο φύλλωμα και έχει δευτερεύουσα δράση κατά εντόμων φυλλώματος. Δρα στο νευρικό σύστημα, λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. Διαχείριση ανθεκτικότητας. Να γίνεται εναλλαγή εφαρμογών με νηματώδοκτονα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αριθ. Εγκρίσης Καταφορές: 3093/13.07.2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 5 ΛΙΤΡΑ [B+DLP]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: βλ.επί τη σήμανση

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

NitroFarm
— από το 1976 —
ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη, Free-phone: 800 11 820 820, Τηλ.: 2310 553354-7, Φαξ: 2310 545325, e-mail: info@nitrofarm.gr, url: www.nitrofarm.gr

Κατάλογος της οξείας: ASENTZA Agro S. A. Alameda das Oceanos Lote 1 (88-11-1) Α΄, Parque das Nações, 1950-207 Lisboa, Portugal

43

05/2020

www.nitrofarm.gr

info@nitrofarm.gr

Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη


NitroFarm
— από το 1976 —

NEMADATE 10 SL

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Λίτρα σκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Τομάτα - LYPES, Μελιτζάνα – SOLME (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις <i>Meloidogyne spp</i> - MELGSP <i>Ditylenchus spp</i> -DITYSP	1	-	1 ^η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες	3 / 20
Πιπεριά - CPSSS (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις <i>Meloidogyne spp</i> - MELGSP <i>Ditylenchus spp</i> -DITYSP	1	-	1 ^η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες	3 / 20
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι Αγγουράκι - CUMSA, Κολοκυθάκι - CUUPG (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις <i>Meloidogyne spp</i> - MELGSP <i>Ditylenchus spp</i> -DITYSP	1	-	1 ^η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες	3 / 20

Παρατηρήσεις: 1. Για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. **2.** Σε ορισμένες συνθήκες, η αραίωση του προϊόντος σε νερό άρδευσης, όπου η τιμή έχει ρυθμιστεί στο pH 5,5 (όξινο), βελτιώνει την απορρόφηση και τη διαθεσιμότητά του, από το ριζικό σύστημα των φυτών.



44

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —