



Rimsulfuron 25% β/β  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

NEO

# RIM 25 WG

**Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε αραβόσιτο, τομάτα και πατάτα. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τις ρίζες των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων προκαλώντας την νέκρωση τους.**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30gr / 60gr



**Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Αριθμός εφαρμογών:**

**Τομάτα:** Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18.  
**Πατάτα:** Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18.

**Αραβόσιτος:** Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 10-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18.

**Παρατηρήσεις:** 1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο και σε ζωήρη ανάπτυξη. 2. Σε μεταφύτευσιμη τομάτα, ο ψεκάσμος να πραγματοποιείται αφού η καλλιέργεια έχει ξεπεράσει το μεταφυτευτικό σοκ.

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Ευαίσθητα αγρωστώδη:** Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Αγριοβρώμη (*Avena sterilis*), Αγρόπυρο/Ελυμος (*Elymus repens*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Στάβρια (*Setaria spp.*) **Ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Αγριοπαμπάκι (*Abutilon theophrasti*), Αγριοπανσές (*Viola arvensis*), Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Γκαλινσόγκα (*Galinsoga spp.*), Ηλιανθος (*Helianthus annuus*), Ηλιοτρόπιτο κοινό (*Heliotropium europaeum*), Θλάστι (*Thlaspi arvense*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Μέντα (*Mentha spp.*), Πολύγυνο (*Polygonum convolvulus*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*) **Μετρίως ευαίσθητα αγρωστώδη:** Αιματόχορτο (*Digitalis sanguinalis*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Κριθάρι (*Hordeum vulgare*). **Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), \*Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Τάτουλας (*Datura stramonium*). \*Μόνο στο στάδιο των κοτυληδόνων.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Διαχείριση ανθεκτικότητας: ● Το σκεύασμα περιέχει rimsulfuron που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. ● Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδο αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων. **Να μην εφαρμόζεται:** ● Όταν φυσάει. ● Εάν αναμένεται βροχή εντός 3 ωρών. =Σε καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθενειών, ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π. ● Σε περίπτωση θερμοκρασιών κάτω των 10-12°C ή πάνω των 25-26°C. ● Σε καλλιέργεια καλαμποκιού ή πατάτας που προορίζεται για Σποροπαράγωγη. ● Σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης τηςπροστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** ● Πριν τη σπορά πρέπει να προηγηθεί όργωμα. ● Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, συνιστάται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 120 ημερών για τη σπορά μπιζελιών και 60 ημερών για τη σπορά ανοιζιάτικου κριθαριού, ζαχαρότευλων και ηλιανθού. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκάστικο υγρό πάνω στα φυτά.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα χλωρίωσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκάσμος με όγκο ψεκάστικού υγρού ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια, πίεση 2 - 3 atm και μικρό τύπο σκότσας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκάστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η εφαρμογή αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκάστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκάσμου.

**Καθαρισμός ψεκάστρου:** Αδειάστε τελείως το ψεκάστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκάστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Συνδυαστικότητα: --** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσκευασμένα προϊόντα: Τομάτα (0231010), Πατάτα (0211000), Αραβόσιτος (0500030): Μη εφαρμόσιμο.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

134

2/2022



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —