

Propamocarb (Προπταμοκάρμπ) 60,7 % β/ο

NEO

THEON

Το THEON είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων των παθογόνων μυκήτων.

Πεδίο εφαρμογής-Ετόχος-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογής: Τομάτα (Θ: Για Πύθιο (*Pythium spp.*), Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.*) με i) 1500-3000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ. σκ./κυβ. μέτρο σε 10-20 λίτρα ψεκ. υγρού/κυβ. μέτρο. 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση στο φυτώχωμα/υπόστρωμα πριν την σπορά/μεταφύτευση. ii) 120-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 6 κ.εκ. σκ./τετραγ. μέτρο σε 3-5 λίτρα ψεκ. υγρού/τετραγ. μέτρο. 3 ποτίσματα/7-10 ημέρες κατά και μετά την σπορά/μεταφύτευση (BBCH 00-19). **Καλλωπιστικά (Θ):** Για Πύθιο (*Pythium spp.*), Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.*) με i) 1500-3000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ. σκ./κυβ. μέτρο σε 10-20 λίτρα ψεκ. υγρού/κυβ. μέτρο. 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση στο φυτώχωμα/υπόστρωμα πριν την σπορά/μεταφύτευση (BBCH 10-59). ii) 200-330 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 10 κ.εκ. σκ./τετραγ. μέτρο σε 3-5 λίτρα ψεκ. υγρού/τετραγ. μέτρο. 2 ποτίσματα/14-21 ημέρες κατά και μετά την σπορά/φύτευση μοσχευμάτων/μεταφύτευση σε γλάστρες (BBCH 00-19). **Παρατηρήσεις:** 1) Εφαρμογή σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και τομάτας. 2) Παραγωγή σπορόφυτων τομάτας για καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου. 3) Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 2 εφαρμογές με πότισμα για τα καλλωπιστικά. 4) Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 3 εφαρμογές με πότισμα για την τομάτα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία propamocarb, η οποία ανήκει στην ομάδα C3 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:-- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Εδωδισες καλλιέργειες δεν μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρθούν στο ίδιο υπόστρωμα πριν την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή. **iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: --.** Τρόπος εφαρμογής: Ενσωμάτωση σε φυτώχωμα/υπόστρωμα ή πότισμα κατά ή μετά τη σπορά/μεταφύτευση. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε το σκεύασμα καλά. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται την ημέρα παρασκευής του. Καθαρίστε μετ'αφ'εξής: Καύση σε εγκατεστημένο για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται σχολαστικά το βυθίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού δύο έως τρεις φορές (2-3) με καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθεί ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Καύση σε εγκατεστημένο για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται σχολαστικά το βυθίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού δύο έως τρεις φορές (2-3) με καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθεί ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. **Συνδυαστικότητα: --.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή σε καλλωπιστικά συνιστάται μια μικρή κλίμακα δοκιμή φυτοτοξικότητας. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Καλλωπιστικά (Θ), Τομάτα (Θ): Δεν ορίζεται. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 100cc/500cc/1LT/5LT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

89

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —