



Cypermethrin 50% β/ο
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

NEO

CYPERB MAX

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινολογιστικό): Κοιλυλίδες, Ευδεμίδα, Τζιτζικακία, Τσιγαρολόγος, Πυρλίδα: 4-30 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 20-150 λίτρα/ στρ. (max 6 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες, Δορυφόρος, Φθορμαία: 8-25 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 8-10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Λεπιδόπτερα, Αφίδες: 10-30 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 30-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΟ: Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ, Θρίπτες, Αφίδες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Diabrotica sp., Σκουλήκι του πράσου, τζιτζικακία: 10 - 25 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ, Αφίδες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Diabrotica sp., τζιτζικακία: 10 - 20κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ, Αφίδες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Diabrotica sp., τζιτζικακία: 10-25 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΜΠΙΖΕΛΙ ΜΕ ΛΟΒΟ, ΦΑΣΟΛΙ ΜΕ ΛΟΒΟ (Υπαίθρου): Θρίπτες, Σπίντα, Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ: 10-25 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ: Άλτης, Δορυφόρος, Αλευρώδης, Αφίδες, Diabrotica sp., τζιτζικακία, Θρίπτες, Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ: 10-20 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΣΙΝΑΠΙ: Άλτης, Phyllotreta atra, Ceuthorrhynchus napi, Meligethes aeneus, Dasineura brassicae, Tropinota hirta 8-30 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 15-60 λίτρα/ στρ. (max 5 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδης σκουλήκι, Αγρότιδα, Σπιντόπτερα, Αλευρώδης, Θρίπτες, Αφίδες: 10-30 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 30-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ, ΣΕΣΚΟΥΛΑ, ΓΟΥΛΙ, ΡΕΒΑ: Conothryncus Medicius, Lixus junco, Αφίδες, Αλευρώδης, Κασσίδα, Πράσινο σκουλήκι, Τριχτολούσια, Euxoa ochrogaster, E. Scandens, E. tessellata, Αγρότιδα ή καραφατέ, Σπιντόπτερα, Φθορμαία: 10-50 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 20-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΡΟΤΟ, ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ, ΡΑΠΑΝΙ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ, ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ (Scorzonera): Πράσινο σκουλήκι, Σπιντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατέ, Άλτης, Δορυφόρος, Αφίδες, τζιτζικακία, Θρίπτες, Αλευρώδης: 10-25 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΣΙΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΟΛΥΡΑ (Triticum spelta): Αφίδες, Αγρότιδα ή καραφατέ, Cnephasia sp., Oulema sp., Κρίκερο: 8-30 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 15-60 λίτρα/ στρ. (max 5 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΜΗΔΙΚΗ: Αλευρώδης, Colaspidea atrum, Φυτονόμος, Αφίδες, Θρίπτες, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδης σκουλήκι, Αγρότιδα ή καραφατέ, Σπιντόπτερα: 10-65 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 15-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Αφίδες, Φυλιδότες, Θρίπτες, Αλευρώδης, Φυλλορύκτες: 10-20 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΑ: Αφίδες, Saperda carcharias, Cryptorhynchus lapathi: 10 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΠΝΟΣ: Κασσίδα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπτες, Πράσινο σκουλήκι, Τριχτολούσια, Euxoa ochrogaster, E. scandens, E. tessellata, Αγρότιδα ή καραφατέ, Σπιντόπτερα, Φθορμαία: 6-20 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 50-150 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΑ: Lymantia dispar: 4 κ.εκ./ 100 λίτρα πεκ. υγρού, με όγκο πεκ. υγρού 200-250 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινολογιστικό): μία (1) εφαρμογή. Πατάτα, Αγκινάρα, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Πεπόνι - Κολοκύθα - Καρπούζι (Υπαίθρου), Τομάτα - Μελιτζάνα (Υπαίθρου), Μπιζέλι με λοβό - Φασόλι με λοβό (Υπαίθρου), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Σέσκουλα, Γουλί, Ρέβα, Καρότο, Ραπανόσελινο, Ραπάνι, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, Λαγόχορτο (Scorzonera), Μηδική, Καλλωπιστικά φυτά, Λεύκη και δενδρόβλια σε φυτώρια, Καπνός, Δασικά είδη σε φυτώριο: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών εφόσον απαιτείται. Ελαιοκράμβη, Σινάπι, Σιτάρι, Σικαλή, Κριθάρι, Βρώμη, Ολύρα (Triticum spelta): Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτολογικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολεισθεί:** -Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. -Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα το απόγευμα (μετά την ώρα συλλογής των μελισσών). **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** ● Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυτικών ή βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. ● Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα ή/και οικονομικές ζημιές και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. ● Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. ● Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθροειδή. ● Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τα καλλωπιστικά φυτά προτείνεται μία δοκιμή φυτοτοξικότητας πριν την καθολική εφαρμογή. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Σιτάρι, σικαλή, κριθάρι, βρώμη, ολύρα (Triticum spelta): 28 ημέρες. Αμπέλι, Ελαιοκράμβη, Σινάπι, Βαμβάκι: 21 ημέρες. Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα, σέσκουλα, ρέβα, γουλί, καπνός: 14 ημέρες. Μηδική: 7 ημέρες. Υπόλοιπες εδωδόμενες καλλιέργειες: 3 ημέρες. Καλλωπιστικά φυτά, δασικά είδη: Μη εφαρμογισμο. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΔΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΛΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
50cc / 100cc /
200cc / 500cc / 1LT

68

01/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —