



ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.
Προϊόν αναφοράς: KARAKAS 10 CS

CAPRITSIO

Αιώρημα μικροκάψουλων (CS)

Lambda Cyhalothrin (Λάμδα Συαλοθρίν) 10% β/ο

Το σκεύασμα είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι'επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράζοντες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.



Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγ. Αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. περίοδο, Μεσοδιάστημα εφαρμोगών σε ημέρες:

Μηλιά: Για Καρπόκαφα, Αφίδες με 10 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Αχλαδιά: Για Καρπόκαφα, Αφίδες με 10 κ.εκ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Ελιά: Για Πυρηνοτρήτη Φυλλοφάγα και ανθοφάγα γενιά με 7,5 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την έναρξη της αναπαραγωγής των ωών, από το ξεδιπλωμα των πρώτων φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη της ταξιανθίας (BBCH 11-59). Αμπέλι (Οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Για Πυραλίδα με 7,5 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Τομάτα Υπαίθρου: i) Για Πράσινο σκουλήκι με 10 κ.εκ. ή 7,5 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1* Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής (για τη δόση των 10 κ.εκ.) ή 2* ψεκασμοί / 14 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής (για τη δόση των 7,5 κ.εκ.). ii) Για Αγρότιδα με 7,5 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2* καθολικοί ψεκασμοί στο έδαφος / 14 ημέρες, πριν την έναρξη της προσβολής. Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο: i) Για Πιερίδα, Μαμέστρα με 7,5 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από το ξεδιπλωμα των πρώτων φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει το τυπικό μέγεθος και μορφή για την ποικιλία (BBCH 11-49). ii) Για Αγρότιδα με 7,5 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής, από το ξεδιπλωμα των πρώτων φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει το τυπικό μέγεθος και μορφή για την ποικιλία (BBCH 11-49). Πατάτα: Για Δορυφόρο με 10 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από το ξεδιπλωμα του πέμπτου φύλλου έως ότου οι κόκκοι φτάσουν το τελικό τους μέγεθος και το περιεχόμενό τους είναι γαλακτώδες (BBCH 15-75). ii) Για Αγρότιδα με 7,5 κ.εκ. σε 20-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής, από το ξεδιπλωμα του πέμπτου φύλλου έως ότου οι κόκκοι φτάσουν το τελικό τους μέγεθος και το περιεχόμενό τους είναι γαλακτώδες (BBCH 15-75).

Παρατηρήσεις: *Το σύνολο των εφαρμोगών στην τομάτα υπαίθρου να μην υπερβαίνει την δόση των 15 κ.εκ. σκ. /στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Δεν επιτρέπεται η χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) ή χρήση επιπνωτικού ψεκαστήρα στον αγρό. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Η επανεξέταση στον αμπελώνα επιτρέπεται μόνο και αφού περάσουν 13 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος στον αμπελώνα, φορώντας γάντια. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς. Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό. Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσταλτικές χρήσεις (ημέρες): Τομάτα υπαίθρου: 3. Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Μηλιά, Αχλαδιά: 7. Πατάτα: 14. Οινοποίηση σταφύλια, Επιτραπέζια σταφύλια: 21. Βρώμη, Σπύρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος: 28. Ελιά: 120. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απορριβαστική συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΛΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΗΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΟΝ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

01/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



NITROFARM 1 - ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Β' ΦΑΣΗ,
Ο.Τ. 40, ΔΑ12α, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —