

Αυξάνει την απορρόφηση των
θρεπτικών συστατικών και
καταπολεμά το αβιοτικό στρες

STATUS

ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

ΚΛΠ6 (B) ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Συστατικά: Πιθολικό οξύ¹ Pidolic acid¹ (CAS: 98-79-3), Πιθολικό Κάλιο¹ Potassium Pidolate¹ (CAS:225-373-9), Μονολαυρική Σορβιτάνη¹ Sorbitan monolaurate¹ (CAS:9005-64-5).

¹ΚΣΥ1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

Δόση εφαρμογής (L/ha): 0,2 έως 0,5.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή διαφυλλικά ή με υδρολίπανση.

Καλλιέργειες - Χρόνος εφαρμογής - Αριθμός εφαρμογών - Λειτουργίες:

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας¹: i) Για την αποδοτικότητα της χρήσης του αζώτου με 1-2 εφαρμογές, BBCH 12-30 (Από τα δύο φύλλα μέχρι την αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους), BBCH 51 (Με την εμφάνιση της ταξιανθίας), BBCH 69 (Στο τέλος της ανθοφορίας). ii) Για ανοχή στο αβιοτικό στρες (στρες ξηρασίας) με 1 εφαρμογή, BBCH 14-33 (Από το στάδιο των 4 φύλλων μέχρι τον κόμβο 3 (τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον κόμβο 2), iii) Για ποιοτικά χαρακτηριστικά: Αυξάνει τον αριθμό κόκκων/στάχυ, τον αριθμό των στάχυων/m², τον αριθμό των βλαστών (στέφια)/φυτό, το συνολικό βάρος των κόκκων (kg/πείραματικό τεμάχιο ή t/ha), την περιοχή πρασίνου (δείκτης NDVI), την περιεκτικότητα σε υγρασία (%), την ευρωστία των φυτών (%), την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (δείκτης SPAD), βάρος νωπού βλαστού (g/πείραματικό τεμάχιο), ύψος φυτού (cm), αριθμό σπόρων/25 λωβούς και βάρος ταξιανθίας (g/2m). 1-2 εφαρμογές, BBCH 29-37 (Από το τέλος του αδειφύματος μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημεία), BBCH 51 (Με την εμφάνιση της ταξιανθίας), BBCH 69-71 (Από το τέλος της ανθοφορίας μέχρι την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού). Διαφυλλική εφαρμογή.

Ξυλώδη πολυετή φυτά²: Για ποιοτικά χαρακτηριστικά: Αυξάνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα (Brix %), το βάρος των σταμπών (g/25 σταμπά), το μήκος των βλαστών (cm), την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (δείκτης SPAD) και το συνολικό βάρος των καρπών (t/ha ή kg/πείραματικό τεμάχιο), το βάρος των καρπών (kg/25 καρπούς). 1-2 εφαρμογές, BBCH 71-77 (Κατά την ανάπτυξη των καρπών). Διαφυλλική εφαρμογή.

Λαχανικά, καλλωπιστικά και αρωματικά φαρμακευτικά φυτά³: i) Για λαχανικά με καρπό BBCH 10-88 (από την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών), ii) Για φυλλώδη λαχανικά BBCH 10-19 (στη φυλλική ανάπτυξη), 1-7 εφαρμογές διαφυλλικά ή με υδρολίπανση. **Ποιοτικά χαρακτηριστικά:** Αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη στα φύλλα (δείκτης SPAD), Δείκτης βλάστησης (NVDI), αριθμός καρπών/φυτών, μέσο βάρος καρπών (g/καρπό), βάρος συγκομισμένων καρπών/φυτών (g/πείραματικό τεμάχιο· kg/πείραματικό τεμάχιο), βάρος εμπορεύσιμων καρπών (kg/αγροτεμάχιο), διάμετρος καρπών (mm/καρπό), βαθμός χρώματος καρπών (%), ζωντάνια φυτών (%).

²Σύμφωνα με το CEN/TS 17700:1:2022 η ομάδα φυτών μεγάλης καλλιέργειας περιλαμβάνει, κριθάρι, φασόλια, τεύτλα, μποράτζα (αγιομήτσα), φαγόπυρο, ρεβίθια, τριφύλλι, βαμβάκι, σκληρό σπάρι, νυχτολούλουδο, χορτολιβαδικά, κάνναβη, φακή, λιναρόσπορο, μηδική, λούπινο, αραβόσιτος, μουστάρδα (για σπόρο), βρώμη, μητζέλι, παταρούνα, πατάτα, κινσά, ελαιοκράμβη, φυλλώδη λαχανικά, ρύζι, σίκαλη, κενταύριο, κτηνοτροφικό λάχανο (ονοβρυχίς), σουσάμι, σόργο, σόγια, αγριοσίταρο (όλυρα), ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο, ηλιανθός, γλυκοπατάτα, καλαμπόκι, καπνός, τριτσάκι, χλοοτάπητα, βίκο και σπάρη.

³Σύμφωνα με το CEN/TS 17700:1:2022 Τα ξυλώδη πολυετή φυτά περιλαμβάνουν αμύγδαλο, μήλο, βερύκοκο, αβοκάντο, δάφνη, μαύρη

σταφίδα, βατόμουρο, μύρτιλο, κάπαρη, στεριμόγια, κέρασι, καστανιά, εσπεριδοειδή, κακάοδέντρο, καφεόδέντρο, κράνμπερι, φύλλα κάρυ, χουρμαδιά, σαμπούκο, σύκο, σταφύλι, γκουάβα, φουντούκι, λυκίσκος, αγριοκυπαρίσσι, καφίρ λάιμ, ακτινίδιο, γλυκίριζα, ασπροβατομουριά, μάνγκο, μούσμουλα, μουριά, νεκταρίνι, ελιά, παπάγια, φρούτο πο πάθους, ροδάκινο, αχλάδι, λωτός, φιστίκι, δαμάσκηνο, ρόδι, κυδώνι, βατόμουρο, κόκκινη σταφίδα, τριανταφυλλίς, τειόδεντρο και καρυδιά.

⁴Σύμφωνα με το CEN/TS 17700:1:2022 Τα λαχανικά, καλλωπιστικά και αρωματικά φαρμακευτικά φυτά περιλαμβάνουν Σπαράγγια, Μελιτζάνα, Μπανάνια, Βασιλικός, Μπρόκολο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κρεμμύδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Καρότο, Κουνουπίδι, Σελινόριζα, Σέλινο, Ραδίκι Κινέζικο Λάχανο, Σχοινόπρασο, Κολοκυθάκι Αγγούρι, Άνηθος, Αντίδι, Μάραθος, Άνθη, Σκόρδο, Πράσο, Μαρούλι, Πεπόνι, Μέντα, Ρίγανη, Μαϊντανός, Φιστίκι, Πιπεριά, Ανανάς, Κολοκύθα Γλιστρία, Ραπανάκι, παντζάρι, Ρόκα, Σαφράν (κρόκος Κοζάνης), Σπανάκι, Φράουλα, Σέσκουλο/Ντοράτα, Καρπούζι.

Ποσότητα νερού: Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα νερού για να εξασφαλίσετε καλή κάλυψη, συνήθως 100-200 l/ha για φυτά μεγάλης καλλιέργειας και 300-3000 l/ha για ξυλώδη πολεητέ φυτά και 250-1000 l/ha για καλλιέργειες λαχανικών ανάλογα με το μέγεθος της καλλιέργειας.

Συνιστώμενη προετοιμασία εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και ξεκινήστε την ανάδευση. Ανακινήστε το δοχείο πριν την ανάμιξη. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα STATUSTM, ακολουθούμενη από το υπόλοιπο νερό. Προσθέστε STATUSTM, στο ψεκαστικό δοχείο μετά την προσθήκη φωτοπροστατευτικών προϊόντων ή διαφυλλικών θρεπτικών στοιχείων.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν είναι συμβατό με τα περισσότερα φωτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά θρεπτικά συστατικά. Για πληροφορίες συμβατότητας, επικοινωνήστε με την NITROFARM S.A. ή τον προμηθευτή σας.

Προσοχή: Τα μη αραιωμένα προϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κατά την ανάμιξη.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε κλειδωμένο κατάστημα χημικών. Φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η θερμοκρασία αποθήκευσης μπορεί να κυμαίνεται από 2°C έως 35°C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Εξοπλισμός: Το STATUSTM είναι κατάλληλο για χρήση με όλους τους τυπικούς ψεκαστήρες αγρού και ακροφύσια σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Μετά τη χρήση, ακολουθήστε τις τυπικές οδηγίες καθαρισμού για τον εξοπλισμό και συμπληρωματικές συστάσεις για πρόληψη ψεκαστικών δοχείων.

Επιπλέον πληροφορίες: Το STATUSTM είναι ένα καθαρό φυτικό βιοδιεγερτικό που συνδυάζει τα MTU και Πιθολικό οξύ, αποδεδειγμένα μόρια με συμπληρωματικούς τρόπους δράσης που προσφέρουν ανοχή στο στρες ξηρασίας, αποτελεσματικότητα χρήσης αζώτου, βελτιωμένη ποιότητα καλλιέργειας. Το MTU επηρεάζει τη φωτοσύνθεση και ενισχύει την ανοχή στο αβιοτικό στρες. Το πιθολικό οξύ είναι μια ένωση σηματοδότησης που ενισχύει την αφομοίωση του αζώτου.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



Δεν αποτελεί
φυτοπροστατευτικό
προϊόν



Σελ. 33



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —