



ΚΛΠ 1(Γ)(II)(β) ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

# VIO-MIX ZBM

ΛΙΠΑΣΜΑ 



Το VIO-MIX ZBM είναι ένα προηγμένο υδατικό λίπασμα που περιέχει βόριο, ψευδάργυρο και μολυβδαίνιο, σε μορφή συμπλόκου, ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ανθοφορίας και της καρποδότησης σε διάφορες καλλιέργειες. Η μοναδική του σύσταση επιτρέπει την υψηλή συγκέντρωση και την εξαιρετική αφομοίωση από τα φυτά των τριών στοιχείων. Το βόριο, ο ψευδάργυρος και το μολυβδαίνιο είναι ζωτικά για τη διαδικασία της γονιμοποίησης, την κυταροδιαίρεση, καθώς και για την πρόληψη διάφορων φυτικών ανωμαλιών όπως το κηλιδώμα στα μήλα ή η μάζη καρδιά στο κουνουπίδι. Ο ψευδάργυρος επιπλέον βοηθά στην ανάπτυξη υγιούς φυλλώματος και βλάστησης, μειώνει την πτώση των καρπών και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής. Το λίπασμα VIO-MIX ZBM ενδείκνυται για εφαρμογή σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των φυτών, όταν οι ανάγκες για Βόριο, Ψευδάργυρο και Μολυβδαίνιο είναι εντεινόμενες, και μπορεί να εφαρμοστεί διαφυλλικά.

Δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία κατά μάζα:  
 5% Ολικό Βόριο (β) ως σύμπλοκο με Μονοοιθανολαμίνη, υδατοδιαλυτό  
 5% Ολικός ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός  
 0,25% Μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό

Κατάλογος Συστατικών (που περιέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%): Trizinc dicitrate (Cas Nr:546-46-3)<sup>1</sup>, Προϊόν αντίδρασης μονοοιθανολαμίνης και βορικού οξέος (1:3) (Cas Nr:EC 701-024-0)<sup>2</sup>, <sup>1</sup>(ΚΕΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών)

**Οδηγίες Χρήσης:**

Γενική δοσολογία: 100-300 cc / 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ή 150-300cc / στρέμμα μέσα από το σύστημα άρδευσης.  
 Ροδάκινα – Αμύγδαλα – Κεράσια: Εφαρμογή μετά την πτώση πετάλων και μετά τη συγκομιδή  
 Μήλα - Αχλάδια: Εφαρμογή κατά την πτώση πετάλων και μετά τη συγκομιδή  
 Αμπέλια: 1η εφαρμογή πριν την άνθηση και 2η εφαρμογή μετά την καρποδότηση με την ίδια δοσολογία.  
 Ελιά: 1-2 διαφυλλικές εφαρμογές, με 1η εφαρμογή κατά την έναρξη της άνθησης (στάδιο 'κροκιάσματος') με και 2η εφαρμογή μετά την καρποδότηση.  
 Κηπευτικά (Τομάτα – Αγγούρι-Πιπεριά κλπ): 1η εφαρμογή πριν το δέσιμο του πρώτου σταυρού.  
 Φυλλώδη κηπευτικά (Κουνουπίδι, Λάχανο, Μπρόκολο): 1η εφαρμογή μόλις τα φυτά αποκτήσουν αρκετό φύλλωμα για την απορρόφηση του προϊόντος.

**Συμπληρωματικές Πληροφορίες:  
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

Συνδυάζεται με τα συνήθη φυτοφάρμακα τα οποία πρέπει να προστίθενται στο τέλος κατά την ανάμιξη. Το διάλυμα πεκαάζεται μόνο του ή σε συνδυασμό, τις δροσερές ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του.  
 Πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.  
 Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε σκιερό και δροσερό μέρος. Ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού (SDS).  
 Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/2 περίπου του απαιτούμενου νερού. Ρίξτε το παρασκεύασμα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 250ml - 1LT - 5LT**

**Δεν αποτελεί  
 φυτοπροστατευτικό  
 προϊόν**



**ΣΕΛ. 57**

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
 +30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
 Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —