



Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
penconazole (πενκοναζόλ) 10% β/ο

PARECE

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

NEO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
50ml / 100ml /
200ml / 400ml / 1LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόση - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Μηλιά, Αχλαδιά: Για Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-40 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φύσκωμα των οφθαλμών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10mm περίπου (BBCH 01-71).

Ροδακινιά, Βερικοκιά: Για Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*, *Podosphaera oxycanthae*) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-40 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φύσκωμα των οφθαλμών έως την αρχή χρωματισμού των καρπών (BBCH 01-71).

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Ωίδιο (*Uncinula necator*) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-40 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα 3 φύλλα μέχρι οι περισσότερες ράγες στο τσαμπί να εφάπτονται μεταξύ τους (BBCH 13-79).

Τομάτα (θερμοκηπίου): Για Ωίδιο (*Leveillula taurica*) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-40 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την εμφάνιση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την αρχή της άνθησης μέχρι το 10% των καρπών να αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 61-81).

Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι - Κολοκυθάκι (Υπαίθρου) μέχρι 2 εφαρμογές/10 ημέρες, Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι - Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου), Κολοκυνθοειδή με μη εδώδιμο φλοιό: Καρπούζι - Πεπόνι - Κολοκύθα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου) μέχρι 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες. Για Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-40 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79).

Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγουράκι (gherkin) (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου): Για Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*) με 30-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-35 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέχρι i) 2 εφαρμογές/7-14 ημέρες (υπαίθρου), ii) 3 εφαρμογές/7-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79).

Παρατηρήσεις: Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή του με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, κατά προτίμηση, επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DIMs (υποομάδα των τριαζολών) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DIMs. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **penconazole**, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, ή ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Επιτραπέζια σταφύλια, Οινοποιήσιμα σταφύλια: 14. Τομάτα (Θερμοκηπίου), Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ, Θ): 3.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

126

04/2024

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —