

WG (Flazasulfuron 25% β/β)  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

# PLEFSI

NEO

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή και Ακαλλιέργητες εκτάσεις. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή χωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (έως τα 4 φύλλα). Έχει υπολειμματική δράση ανάλογα με τη δόση εφαρμογής. Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται δια μέσου της συμπλαστικής και αποπλαστικής κίνησης και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη τους.



Συσκευασίες:  
20gr / 50gr / 100gr



Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές, υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flazasulfuron, η οποία ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός, με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα, σε λωρίδες, με μικτό τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για να αποφευχθεί να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος, με τα πράσινα μέρη των καλλιεργειών (φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, άνθη, τσαμπιά ή τις παραφυάδες) και τις μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστικού: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊτ-φρουτ, Λάιμ), Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής. Ελιά (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): 0 (Φθινοπωρινή εφαρμογή), καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής. Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Δεν ορίζεται.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

111

04/2024



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)



[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —

# PLEFSI

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

**Στόχος:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*. **Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ):** 20-60<sup>(7)</sup>.

**Πεδίο Εφαρμογής-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά- Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Μανταρινιά, Λάιμ (Πράσινα λεμόνια):** Δόση: 6-20 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή την άνοιξη, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.

**Ελιά:** i) Δόση: 6-10 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή το φθινόπωρο, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. ii) Δόση: 6-20 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή την άνοιξη, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.

**Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια):** Δόση: 6-20 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά, των ζιζανίων κατά τον Χειμώνα-Άνοιξη, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.

**Ακαλλιεργήτες εκτάσεις (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές):** Δόση: 6-13,6 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.

**Ακαλλιεργήτες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι):** Δόση: 6-20 γραμ. σκ./στρ. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.

**Παρατηρήσεις:** 1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος και καρπούς. 2. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. 3. Οι εφαρμογές μεταφυτρωτικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι το 4<sup>ο</sup> φύλλο των ζιζανίων. 4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 5. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 6. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες. 7. Όγκος ψεκαστικού υγρού: i) 20-40 λίτρα/στρ με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα, ii) 60 λίτρα/στρ με χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα.

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

**Αμπέλι: Προφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Conyza canadensis* Κόνυζα, *Veronica persica* Βερόνικα, *Amaranthus retroflexus* Τραχύ βλήτο, *Chenopodium album* Λουβουδιά. -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ.: *Senecio vulgaris* Μαρτιάκος, *Amaranthus retroflexus* Τραχύ βλήτο, *Chenopodium album* Λουβουδιά, *Mercurialis annua* Σκαρολάχανο, *Conyza canadensis* Κόνυζα, *Geranium rotundifolium* Γεράνι, *Polygonum persicaria* Αγριοπιπεριά, *Polygonum aviculare* Πολυκόμπι, *Sonchus asper* Ζοχός τραχύς, *Matricaria inodora* Χαμομήλι, *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια, *Echinochloa crus-galli* Μουχρίτσα, *Lolium multiflorum*

Πολύανθη Ήρα, *Setaria viridis* Σετάρια, *Digitaria sanguinalis* Αιματόχορτο, *Setaria verticillata* Σετάρια σπονδυλωτή, *Poa annua* ετήσια Πόα. **Νωρίς μεταφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Chamaemelum mixtum* Χαμομήλι, *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια. -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Conyza canadensis* Κόνυζα, *Erodium malacoides* Βελονίδα μαλακοειδής, *Geranium dissectum* Γεράνι, *Geranium molle* Γεράνι, *Geranium rotundifolium* Γεράνι, *Senecio vulgaris* Μαρτιάκος, *Polygonum aviculare* Πολυκόμπι, *Conyza canadensis* Κόνυζα, *Festuca elatior*, *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια, *Stellaria media* Στελλάρις, *Lamium amplexicaule* Δωδεκάκνι, *Sinapis arvensis* Σινάπι, *Carduus crispus* Γαϊδουράγκαθος.

**Εσπεριδοειδή: Προφυτρωτικά:** -. **Νωρίς μεταφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Amaranthus blitoides* Πλαγιαστό βλήτο. -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Portulaca oleracea* Αντράκλα, *Amaranthus retroflexus* Τραχύ βλήτο, *Amaranthus albus* Άσπρο βλήτο, *Amaranthus sp.* Βλήτο, *Sonchus oleraceus* Ζωχός, *Galium aparine* Μεγαλόκαρπη κολλησιόδα, *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια, *Malva parviflora*, *Chenopodium album* Λουβουδιά, *Euphorbia chamaesyce* Χαμαισική, *Conyza canadensis* Κόνυζα, *Capsella bursa-pastoris* Καφέλλα, *Picris echioides* Πικρίς, *Parietaria sp.* Περδικούλι, *Fumaria sp* Καπνόχορτο, *Senecio vulgaris* Μαρτιάκος, *Urtica urens* Τσουκνίδα, *Setaria verticillata* Σετάρια σπονδυλωτή, *Poa annua* ετήσια Πόα, *Echinochloa crus-galli* Μουχρίτσα, *Lolium sp* Ήρα. Μέτριως Ευαίσθητα ζιζάνια: *Setaria sp.* Σετάριας, *Sonchus oleraceus* Ζωχός.

**Ελιές: Προφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ. (επιπλέον των ανωτέρω): *Calendula arvensis* Καλεντούλα, *Galium tricornutum*, *Sinapis arvensis* Σινάπι, *Lolium rigidum* Λεπτή Ήρα.

**Νωρίς μεταφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Amaranthus retroflexus*, *Urtica sp* Τσουκνίδες, *Sonchus oleraceus* Ζωχός. Μέτριως ευαίσθητα: *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια. -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια, *Geranium dissectum* Γεράνι, *Malva parviflora*, *Calendula arvensis* Καλεντούλα, *Senecio vulgaris* Μαρτιάκος, *Stellaria media* Στελλάρις, *Rumex acetosella* Λάπαθο, *Sisymbrium officinalis* Αγριοβρούβα/Σισύμβριο φαρμακευτικό, *Lolium perenne* Ήρα πολυετής, *Lolium rigidum* Λεπτή Ήρα.

**Ακαλλιεργήτες εκτάσεις: Προφυτρωτικά:** -. **Νωρίς μεταφυτρωτικά:** -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Diplotaxis erucoides* Ρόκα άγρια. -Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ. (επιπλέον των ανωτέρω): Μέτριως ευαίσθητα: *Cirsium arvense* Κίρσιο.



112

04/2024



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

**NitroFarm**

— από το 1976 —