



Bentazone (μπενταζόν) 48% β/ο
Πυκνό Διάλυμα (SL)

BENTA⁴⁸⁰ SL

Συσκευασίες: 200ml / 1LT / 5LT

Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Δρα με την αναστολή της φωτοσύνθεσης (φωτοσυστήματος II). Το δραστικό συστατικό απορροφάται κυρίως από τα πράσινα μέρη των φυτών και δρα ως αναστολέας της φωτοσύνθεσης.



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Αγρία ρόκα (*Diplotaxis erucoides*), Μολόχα (*Malva neglecta*). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Περιπλοκόδα (*Convolvulus arvensis*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριομπιτσιάκι (*Abutilon theophrasti*), Στίφνος (*Solanum nigrum*) με 200 κ.εκ. σε 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο από το 1^ο έως το 5^ο πραγματικό φύλλο (BBCH 10-15). Ρύζι: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριομυλιτζάνα (*Xanthium Strumarium*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αναγάλλις (*Anagallis arvensis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βούτομο (*Butomus umbellatus*), Τραχύς Σωχός (*Sonchus asper*), Κίτρινη Κύπερη (*Cyperus esculentus*), Λινδέρνια (*Lindernia* sp.), Μοσχοκύπερη (*Cyperus difformis*), Ρανούνκουλος (*Ranunculus sardous*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Ραγάζι (*Scirpus maritimus*), Σκίρπος (*Scirpus mucronatus*), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*), Τάτουλας (*Datura stramonium*). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), *Bidens* sp., Δωδεκανόι (*Lamium amplexicaule*), Ιπτάμια (*Ipomoea* sp.), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Πεντάνευρο (*Alois plantago-aquatica*), Πολυκόμπος (*Polygonum convolvulus*), Στίφνος (*Solanum nigrum*) με 200 κ.εκ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3^ο φύλλο της καλλιέργειας έως το τέλος του αδαφώματος (BBCH 13-29). Σόργο*, Κεχρί*, Κεχροσετάρια* (Χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για Πλατύφυλλα ζιζάνια με 200 κ.εκ. σε 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά, από το 1^ο έως το 5^ο πραγματικό φύλλο (BBCH 10-15). Γλυκό καλαμπόκι* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Πλατύφυλλα ζιζάνια με 200 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά, από το 2^ο έως το 9^ο πραγματικό φύλλο (BBCH 12-19). Μπιζέλι φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Πλατύφυλλα ζιζάνια με 200 κ.εκ. σε 22-45 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά, πριν την εμφάνιση των ανθέων (BBCH <51). Κουκί φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Πλατύφυλλα ζιζάνια με 200 κ.εκ. σε 22-45 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο 3^ο πραγματικό φύλλο (BBCH 13). Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης.

Παρατηρήσεις: 1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα γιγνάνια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό. 2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων. 3. Να μην υπερβείνεται η δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα ή των 96 γραμ. δ.ο./στρ. έτος. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του σόργου, του γλυκού καλαμποκιού, του κεχρί, της κεχροσετάριας, του μπιζελιού, του κουκιού, της σόγιας και του λιναριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή ήρασια ή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες στρες. Μην εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή και για διάστημα 6 ωρών μετά από βροχή. Μην εφαρμόζεται όταν φυσάει. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει bentazone, που ανήκει στην ομάδα 6 κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα, που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεται στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. **Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 15-40 λίτρα νερό/στρ., χαμηλή πίεση και καλή διαβροχή των ζιζανίων. Εφαρμογή μόνο με τραπέζι. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες):** Αραβόσιτος, Ρύζι, Σόργο, Γλυκό καλαμπόκι, Κεχρί-Κεχροσετάρια, Σόγια, Λινάρι: Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. Μπιζέλι με λοβό, Κουκί με λοβό: 35. Μπιζέλι χωρίς λοβό, Κουκί χωρίς λοβό: 43. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΕΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΗΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΖ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**