

Deltamethrin (Δελταμεθρίν): 2,5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΕΡΟΣ-ΦΙ

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: ----.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: ● Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10ml / 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1LT / 5LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



14

01/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμ. ανά καλλιερ. περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά): i) Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάριο, Μύγα της Μεσογείου, Αλευρώδης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά):** Αφίδες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** i) Καρπόκαφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα, Ανθονόμος, Μηλοδόμυγες, Θρίπες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα Αχλαδιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. iv) Ψώρα Σαν Ζοσέ με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά):** i) Φυλλοδέτες, Ανάρσια με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέτιδα ή μύγα κερασιού με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα Μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαφα Δαμασκηλιάς με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. v) Ψώρα Σαν Ζοσέ με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή το καλοκαίρι κατά κινητών μορφών. **Αμπέλι*:** i) Ευδεμίδα με 50 κ.εκ. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κογκυλίδα με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκια, Αφίδες, Πυραλίδα, Τσιγαρολόγος, Κοφτοσκούληκα με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελιά:** i) Δάκος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. ii) Λεκάριο, Θρίπες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. iii) Πυρηνότρυτς με 30 κ.εκ. (ανθοβ.) ή 50 κ.εκ. (καρποβ.) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης (ανθοβία γενιά) και αμέσως μετά την καρποδίαση (καρπόβια γενιά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Φράουλα:** Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. **Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο:** Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 (Θ) κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες (Υ) και 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάλυση ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Τομάτα, Μελιτζάνα (Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ.

υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-42 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες (Θ) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αγγούρι (Υ+Θ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μαρούλι (Υ):** i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Φύλλο Σέλινου, Ρόκα:** i) Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μπιζέλι:** i) Αφίδα των μπιζελιών, Σιτόνα με 25 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών, Κάμπιες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Όσπρια (Φασόλια, Κουκιά):** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 25-30 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60). **Σπαράγγι:** Αφίδες, Θρίπες με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μετά τη συγκομιδή, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Μανιτάρια:** Δίπτερα, Κολλεμβόλα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Πατάτα:** i) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Βαμβάκι:** i) Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Τζιτζικάκια με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα, Θρίπες, Λύγκος, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Ελαιοκράμβη:** Άλτης, Αφίδες, Σκαθάρι με 30 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και έως την αρχή της άνθησης. **Ζαχαρότευτλα:** i) Άλτης, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σκαθάρι, Κλεονός με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Καπνός:** Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα, Επίτριξ με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Αραβόσιτος**:** i) Πυραλίδα, Σεζζμία, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Διαβρώτικα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Σιτάρι, Κριθάρι:** Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκα με 25-30 κ.εκ. σκευ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1-2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. **Καλλωπιστικά (Υ+Θ, Φυτώρια):** i) Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Μηλοδόμυγες, Κάμπια γαρυφάλοι με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-35 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδεις με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π. **Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia sp.* και *Sesamia sp.*

