



Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) • Spinosad (Σπινουσάντ) 48% β/ο

ΝΟΚΑΟΥΤ

NEO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 50ml, 200ml, 500ml, 1LT



Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με διελασματική δράση, της ομάδας των νεονικωτινοειδών. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικωτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Το spinosad είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση. Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίησή τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

Πεδίο εφαρμογής - Ασθένειες - Δόσεις σκευάσματος* - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιτική περίοδο. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:

Μηλιά, Αχλαδιά: Καρπόκαφα των μηλών (*Cydia pomonella*), Νάρκη των γιγαρτοκάρπων (*Lithocolletis blancardella*) με δόση 20-30 κ.εκ./100 λίτρα πεκ. υγρού. Όγκος πεκ. υγρού: 100-125 λίτρα/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές / 7-14 ημέρες σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Αμπέλι: i) Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*) με δόση 10-15 κ.εκ./100 λίτρα πεκ. υγρού. Όγκος πεκ. υγρού: 40-120 λίτρα/στρ. Μέχρι 4 εφαρμογές / 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή, στην 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ii) Θρίπες της Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*) με δόση 20-25 κ.εκ./100 λίτρα πεκ. υγρού. Όγκος πεκ. υγρού: 40-80 λίτρα/στρ. Μέχρι 4 εφαρμογές / 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί.

Βαμβάκι: Πρόσδιο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*) με δόση 15-20 (κ.εκ./στρ). Όγκος πεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές / 10 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.

Πατάτα: Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*) με δόση 5 κ.εκ./100 λίτρα πεκ. υγρού. Όγκος πεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές / 7-10 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.

Παρατηρήσεις: *Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική spinosad, η οποία ανήκει στην ομάδα 5 κατά IRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται: 1. η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα. 2. Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων στόχων σε χαμηλά επίπεδα. 3. Επεμβάσεις όταν ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα. 4. Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό. 5. Εφαρμογή των εγκεκριμένων δόσεων και όχι μικρότερων. 6. Εως δύο (2) εφαρμογές ανά γενιά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενιά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός Ψεκαστήρα: -Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα. -Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. -Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. -Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προφυγμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μηλιά, Αχλαδιά, Πατάτα: 7 ημέρες. Αμπέλι: 14 ημέρες. Βαμβάκι: 21 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

17

01/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —