



**ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΚΑΛΙΟΥ - ΘΕΙΟΥ**

ΛΙΠΑΣΜΑ



K-S ultimate

NPK (S) 0-0-25 (42) / 0-0-20,75 (16,8)
ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
25% οξείδιο του καλίου (K₂O) (=20,75% K) υδατοδιαλυτό
42% τριοξείδιο του θείου (SO₃) (=16,8% S) υδατοδιαλυτό

Συστατικά: Θειοθειικό κάλιο (Αριθ. CAS 10294-66-3)
ΚΣΥ1, Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

Υγρό σε διάλυμα: ● Φτωχό σε χλωριούχα ● Πυκνότητα περίπου 1,475 kg/λίτρο.

Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (0-40°C).

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Σε περίπτωση τυχαίας απελευθέρωσης, απορροφήστε το με άμμο ή χώμα και συλλέξτε το μηχανικά σε κατάλληλα δοχεία.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και σωστά επισήμασμένα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:

Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του λιπάσματος.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μην διασκορπίζετε το δοχείο στο περιβάλλον.

Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την ανάμιξη με οξειδωτικά μέσα και ισχυρά οξέα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η επαφή με οξέα απελευθερώνει τοξικά αέρια.

**Δεν αποτελεί
φυτοπροστατευτικό
προϊόν**



Το Θειοθειικό κάλιο είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες στα βιολογικά στάδια των φυτών, όπου οι ανάγκες σε κάλιο είναι αυξημένες.

Γενική δοσολογία: 1-2 λίτρα / 1000m² μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επαναλήψεις όταν είναι αναγκαίο κάθε 15-20 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα: 1-3 εφαρμογές συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και 2η εφαρμογή 10-15 ημέρες μετά με την ίδια δοσολογία. Επανάληψη αν χρειασθεί σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.

Εσπεριδοειδή: 1η εφαρμογή κατά την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών με 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό. 1-2 επαναλήψεις με την ίδια δοσολογία.

Ελιά: 1η εφαρμογή στο 'γυάλισμα' του καρπού με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και επαναλήψεις κάθε 20-25 ημέρες με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερού.

Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές από το στάδιο του περκασμού με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό και κάθε 15-20 ημέρες με την ίδια δοσολογία.

Κηπευτικά, φράουλα: 300-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού των καρπών. 1-2 λίτρα / 1000m² για εφαρμογές μέσα από το σύστημα άρδευσης.

Πατάτα: 1η εφαρμογή μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό ή με 2-3 λίτρα / 1000m² με το σύστημα άρδευσης. Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.

Καρότο, σκόρδο: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200 300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό από το σχηματισμό του ριζώματος και έπειτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Θειοθειικό κάλιο συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Σε ψεκαστικά διαλύματα του Θειοθειικού καλίου το pH δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 6.

Επίσης δεν ενδείκνυται η εφαρμογή σε εδάφη με pH χαμηλότερο του 6.

Σε κάθε περίπτωση άγνωστου συνδυασμού να γίνεται προηγουμένως δοκιμή σε μικρή έκταση.

Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΣΕΛ. 50