



NEO

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Fosetyl-Al (Φοζετύλ-αλ) 80% β/β
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Χημική ομάδα: Αλκυλοφωσφορικά

GRIFOS

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το fosetyl-Al, ανήκει στις φωσφονικές ενώσεις και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των спорίων ή την ανάπτυξη του μυκηλίου και το σχηματισμό των спорίων. Χάρη στη διασυστηματική δράση του (κινείται ανοδικά και καθοδικά), επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά Δομυκήτων (Περωνόσπορος, Φυτόφθορα) καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*).

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Εσπεριδοειδή⁽²⁾ (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρούτ): Για Φυτόφθορα (*Phytophthora* sp.). i) με 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-600 γρ. σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ένας ψεκασμός το μήνα αρχίζοντας από το φύσκιωμα των οφθαλμών και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). 1-2 εφαρμογές / 30 ημέρες. ii) με 400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 γρ. σε 125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή στο φυτώριο/σπορείο. 1-2 εφαρμογές / 60 ημέρες. iii) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (2,5 γρ. σκ./λίτρο). 1 εφαρμογή με την επάλειψη.

Μηλιά⁽²⁾: i) Για Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*) με 150-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150-375 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 54-77). 1-2 εφαρμογές / 7-12 ημέρες. ii) Για Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (*Phytophthora cactorum*) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250-375 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπώσεως μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). 1-2 εφαρμογές / 30 ημέρες. iii) Για Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250-375 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους (BBCH 61-75). 1-2 εφαρμογές / 7 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο): Για Περωνόσπορο (*Plasmopara viticola*) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλείσιμο» του τσαμπιού (BBCH 15-79). 1-4 εφαρμογές / 7-12 ημέρες.

Φράουλα⁽²⁾ (Y+Θ): Για Σήψεις λαιμού και ριζών (*Phytophthora cactorum*), (*Phytophthora fragariae*). i) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). 1-3 εφαρμογές / 8-10 ημέρες. ii) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (όγκος ψεκ. υγρού: 10 λίτρα/στρ.). Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση. 1 εφαρμογή.

Τομάτα (Y+Θ): Για Περωνόσπορο (*Phytophthora infestans*) με 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-300 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). 1-3 εφαρμογές / 8-10 ημέρες.

Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκύθι / Κολοκυθάκι (Y+Θ): Για Περωνόσπορο (*Pseudoperonospora cubensis*) με 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-300 γρ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). 1-3 εφαρμογές / 8-10 ημέρες.

Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Κολοκύθα (Y+Θ): Για Περωνόσπορο (*Pseudoperonospora*

cubensis) με 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-300 γρ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). 1-2 εφαρμογές / 8-10 ημέρες.

Μαρούλι (Y+Θ): Για Περωνόσπορο (*Bremia lactucae*) με 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-300 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45). 1-3 εφαρμογές / 10-14 ημέρες.

Καλλωπιστικά⁽²⁾ (Y+Θ): Για Φυτόφθορα (*Phytophthora* sp.). i) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250-300 γρ. σε 100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. 1-3 εφαρμογές / 30 ημέρες. ii) με 5-10 γρ./Τετ. μέτρο (όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ.). 1-2 εφαρμογές με ριζοπότισμα / 30 ημέρες.

Παρατηρήσεις: Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. ²Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών 4 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο. ²Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια της Μηλιάς 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο. ²Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια της Φράουλας 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fosetyl-Al, η οποία ανήκει στην ομάδα 33 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Y+Θ), Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκύθι/Κολοκυθάκι (Y+Θ), Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Κολοκύθα (Y+Θ): 3 ημέρες. Φράουλα (Y+Θ) ψεκασμός φυλλώματος: 14 ημέρες. Φράουλα (Y+Θ) εμβάπτιση ριζώματος: ---. Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Μαρούλι (Y+Θ): 15 ημέρες. Μηλιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινόποιήσιμο): 28 ημέρες. Καλλωπιστικά: ---.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 150gr / 500gr / 1Kg / 1,25Kg / 2,5Kg / 5Kg

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

63

06/2025



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —