



Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Propaquizafop (Προπακουιζαφόπ) 10 % β/ο

NEO

READY

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 100cc / 1LT / 3LT / 5LT



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα των ζιζανίων. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Στόχος: i) Ρύζι, για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια. ii) Όλες οι υπόλοιπες καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης, για ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια.

Δόσεις σκευάσματος (Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα): 20-60 για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** i) Για Ρύζι, η εφαρμογή γίνεται πριν τη σπορά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε αποστραγγισμένο έδαφος. ii) Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων: α) Για ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) Για πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Για το βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.

Πεδίο εφαρμογής - Δόσεις σκευάσματος (κ.εκ. σκ./στρ.):
Λεμονιά - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Γκρέιπ φρουτ - Κουμκουάτ, Αμυγδαλιά - Καστανιά - Φιστικιά - Καρυδιά - Φουντουκιά - Κουκουναριά, Μηλιά - Αχλαδιά, Ροδακινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηλιά - Κερασιά, Αμπέλι, Σκόρδο - Κρεμμύδια - Ασκαλόνια, Τομάτα - Μελιτζάνα, Πεπόνι (υπαίθρου), Μπρόκολο, Λάχανο - Κουνουπιδιά, Φασολάκια (φρέσκα) (με και χωρίς λοβό) - Αρακάς (φρέσκος) (με και χωρίς λοβό), Όσπρια: Αρακάς - Ρεβίθια - Φακές - Φασόλια - Λούπινα - Κουκιά, Ελαιοκράμβη - Βαμβάκι - Λινάρι, Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Καλλωπιστικά φυτά - Φυτόρια Δασικά δένδρα: α) 75-120, β) 150-200, γ) 100-150. Καρότο - Ρίζα μαϊντανού, Σπανάκι, Πατάτα, Μηδική - Τριφύλλι - Βίκος: α) 75-120, β) 150, γ) 100-150. Μάραθος: α) 75-120, β) 125, γ) 100-125. Σπαράγγι: α) 75-120, β) 120, γ) 100-120. Ηλιάνθος - Σόγια, Ρύζι: 75-120.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος: i) Λεμονιά - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Γκρέιπ φρουτ - Κουμκουάτ, Αμυγδαλιά - Καστανιά - Φιστικιά - Καρυδιά - Φουντουκιά - Κουκουναριά, Βερικοκιά - Δαμασκηλιά - Κερασιά: 1 εφαρμογή (πριν την ανόρθωση της καλλιέργειας). ii) Για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης: 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1. Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια. 2. Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. 3. Η χρήση στα πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τα νεράντζια, περγαμόντο. 4. Η χρήση στα μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημενίνες, ταγγερίνες. 5. Η χρήση στα γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τις φράπες. 6. Η χρήση στα λεμόνια περιλαμβάνει και τα κίτρολεμονα. 7. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

***Καταπολεμώμενα ζιζάνια:** i) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena fatua & A. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), Bromus sp. (Βρώμοι), Digitaria sanguinalis (Αμαύχοχορτο), Echinochloa crus-galli & E. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum sp. (Αγριοκριθάρι), Lolium sp. (Ήρες), Phalaris sp. (Φαλαρίδες), Panicum sp. (Πάνικο), Setaria sp. (Σετάρια), Sorghum halepense (Βέλιουρα από σπόρο), Triticum sp. (Σιτάρι). ii) Πολυετή ζιζάνια: Agropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμός), Agrostis sp. (Αγρωστής), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Poa trivialis (Τραχεία λιβαδοτόα), Poa pratensis (λεία λιβαδοτόα), Sorghum halepense (Βέλιουρα από ριζώματα).

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική προπακουιζαφόπ, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε μπζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με τρισεύρη μικρότερη από 45 μί (2-3 atm).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά από την πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Λεμονιά, Κίτρολεμονα, Πορτοκαλιά, Νεράντζι, Περγαμόντο, Μανταρινιά, Κλημενίνες, Ταγγερίνες, Φράπες, Κουμκουάτ, Αμυγδαλιά, Καστανιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Κουκουναριά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βερικοκιά: Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την ανόρθωση της καλλιέργειας). Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι, Καρότο, Ρίζα μαϊντανού, Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλόνια, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπιδιά, Σπανάκι, Μάραθος, Σπαράγγι: 30. Πεπόνι υπαίθρου: 60. Φασολάκια φρέσκα (με και χωρίς λοβό), Αρακάς φρέσκος (με και χωρίς λοβό), Πατάτα, Καπνός: 40. Όσπρια: Φακές, Ρεβίθια, Φασόλια, Λούπινα, Κουκιά: 50. Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, Ηλιάνθος, Σόγια, Λινάρι: 90. Ζαχαρότευτλα, Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος: 45. Ρύζι: Δ.Ε. Καλλωπιστικά φυτά, Φυτόρια, Δασικά δένδρα: --.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική απορριβαστική συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΖ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —