



SINAPSIS

συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη κορυφαίου τμήμα του κορμού (0,50 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), όπου είναι η πρωτιμωμένη περιοχή αναπαραγωγής του θηλικού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο. **Βατόμουρο (Θ), Ξυλόμορο (Θ), Μυρτίλο (Θ) (Ψρήσιες ήσσονος σημασίας):** Για *Drosophila suzukii* με 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού < 50-100 λίτρα/στρέμμα (ή/και ψεκ. υγρού). Με 25-2 ψεκασμούς φυλλώματος/7-14 ημέρες. **Μαρούλι (Υ):** Για *Drosophila suzukii* με 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού < 50-100 λίτρα/στρέμμα (ή/και ψεκ. υγρού). Με 25-2 ψεκασμούς/7-10 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνοιμίων. **Γλυκοπατάνη (Ψρήσιες ήσσονος σημασίας):** Για *Duronicella fovealis* με 5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού < 100 λίτρα/στρέμμα (ή/και ψεκ. υγρού). Με 3 ψεκασμούς/7-10 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνοιμίων. **Παραρησίτης:** Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. ***Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 2-2 κ.εκ./λίτρη στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας. ***Στην τομάτα, η γρούνη και θερμότητα, για την αντιμετώπιση του φυλλορύχτη, το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./σκεύασμα/λίτρη σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./λίτρη. ***Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (Simpell Pro 480 SC 20-25 κ.εκ. σκεύασμα/λίτρη + 250-300 κ.εκ. σ.κ./λίτρη παραφινικό λάδι). ***Επιδόνηση εφαρμογής εφόσον βρεθεί μέσα σε 4 ώρες. ● Η χρήση στο μαρούλι περιλαμβάνει το κατάρτο, το κεφάλαιο, το κοινό και το μαρούλι σάλατα. ● Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Drosophila suzukii* στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, του αμπιέλι και της φρούλας και κατά του *Sporodopta frugiperda* στην καλλιέργεια του βαμβάκιου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. ● Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της θαυμακινιάς, της κερασιάς, της βυσσινιάς, της φιστικιάς, του στανακού, της ρόκας, των φοινικειδών, του Βατόμουρου, του σμέουρου, του μυρτιλίου, του μαρούλιου και της γλυκοπατάνης από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **Ειδικές συστάσεις γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλικάται:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική spinosad, η οποία ανήκει στην ομάδα 5 κατά IRAC. Διακρίνεται ανθεκτικότητα: i) Η αναλογία με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα. 2. Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων στόχων σε χαμηλά επίπεδα. 3. Επεμβάσεις χωρίς όντα ή πληθυσμούς των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα. 4. Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό. 5. Εφαρμογή των εγκεκριμένων δόσεων και όχι μικρότερες. 6. Έως δύο (2) εφαρμογές ανά γενεά του κάθε εντόμου-στόχου και ανά αναλογία για την επόμενη γενεά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε προγράμματα IPM στα θερμοκήπια:** ● Εξέταση των βουβινιών, παρασιτισμένων μυνοπεπτογόνων και αρπακτικών εντόμων και άκαρων σε απευθείας ψεκασμό με το σκεύασμα να αποβεί επιβλητική. ● Να μη γίνεται εξάπλωση βουβινιών για 24 ώρες μετά την εφαρμογή, καθώς επίσης παρασιτισμών και αρπακτικών εντόμων και άκαρων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας – ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργιών που ακολουθούν – iii) της πρόσβασης του ανθρώπου και iv των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην πεκαυμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από φυλλική επιφάνεια. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. **Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται τρεις (3) φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Απομεινιώματα με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. **Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες):** Μηλιά, Αχλαδιά (εφαρμογή για καταπολέμηση της καρπόκακας και νάρκης), Ροδακινιά, Βερικοκιά, Πατάτα, Δαμασκινιά, Κερασιά-Βυσσινιά, Ξυλόμορο, Βατόμουρο, Μυρτίλο, Φιστικιά, Γλυκοπατάνη, 7. Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της ψύλλας), Αμπιέλι: 14. Τομάτα (Υ/Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Σπανακά, Ρόκα, Μαρούλι (Υ): 3. Φρούλα: 1. Βαμβάκι: 21. Φοινικειδείς – **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τολάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική φαρμακωμένη συσκευασία του σε μέτρο δροσερό και καλά αεριζόμενο.



04/2026

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο



NitroFarm

— από το 1976 —