



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Dodine (Ντοντίν) 40% β/ο

NEO

ACUSTIC®

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου των Μηλοειδών, του εξώασκου, της κυλινδροσπορίωσης και της ανθράκωσης των Πυρηνόκαρπων, καθώς και του κυκλοκόνιου και γλοισπορίου της Ελιάς.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για Φουζικλάδιο με 170 κ.εκ. σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος/14 ημέρες που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθισης (BBCH 10-59) Και/ή Από το τέλος της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 70- 79). **Κερασιά¹:** Για **Κυλινδροσπορίωση, Ανθράκωση** με 170 κ.εκ. σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος/14 ημέρες τέλος της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν φτάσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 70-79). **Ροδακινιά²:** Για Εξώασκο με 170 κ.εκ. σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος/14 ημέρες που ξεκινούν από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι πριν την έναρξη της άνθισης (BBCH 10-59). **Ελιά^{3,4} (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):** Για **Κυκλοκόνιο, Γλοισπόριο. i)** Με 225 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ, 1 ψεκασμός φυλλώματος που ξεκινάει από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 11-69) ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης τους (BBCH 78-89). **ii)** Με 170 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ, μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος/14 ημέρες που ξεκινούν από τον διαχωρισμό των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 11-69) και/ή το φθινόπωρο/χειμώνα από το στάδιο όπου οι καρποί έχουν φτάσει στο 90% του τελικού τους μεγέθους μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης τους (BBCH 78-89).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει και τη Βυσσινιά. 2. Η χρήση στην Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινία. 3. Στην καλλιέργεια της ελιάς να πραγματοποιείται είτε μια (1) μόνο εφαρμογή με μέγιστη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή δύο (2) εφαρμογές με δόση 170 κ.εκ./ στρ. ανά εφαρμογή. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολκιστεί: Α) αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας το σκεύασμα συνιστάται: ● Να εφαρμόζεται προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. ● Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα (σε προγράμματα ψεκασμών οι πρώτες 1-2 εφαρμογές να πραγματοποιούνται με το ACUSTIC). **Χρονικό διάστημα ασφαλείας**

μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: **Ελιά:** Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα. **Πυρηνόκαρπα:** -10 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος και -5 ημέρες μετά τον ψεκασμό για εργασίες συγκομιδής. **Μηλοειδή:** 1 ημέρα μετά τον ψεκασμό για εργασίες συντήρησης ή/και αραιώματος. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Το σκεύασμα δεν αναμένεται να είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμοι καλύψεως φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορροπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): 7 ημέρες. Κερασιά - Βυσσινιά: 14 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 60 ημέρες. Ροδακινιά - Νεκταρινιά: 75 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική παραβίαση συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

03/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —