



Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Chlorantraniliprole (Χλοραντраниλιπρόλ) 20% β/ο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 50cc / 200cc / 500cc / 1LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά: i) Για Καρτόκαφα, Φυλλοδέστες, Οστρίνια με 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 70-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για Φυλλορύκτες με 16-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 27 κ.εκ. (max) σε 70-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρποδέση έως την ωρίμανση (BBCH 71-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες. Για τους φυλλορύκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες. Ελάχιστη δόση/στρέμμα 16 κ.εκ. **Ροδακινιά, Βερικοκιά:** i) Για Καρτόκαφα με 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 70-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για Ανάσρια με 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 70-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρποδέση έως την ωρίμανση (BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 16 κ.εκ. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. **Δαμασκηλιά:** Για Γκροφολίτα, **Orheopterha brumata** με 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 70-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρποδέση έως την ωρίμανση (BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους & επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Για την **Orheopterha brumata** εφαρμόζω με την εμφάνιση των προνυμφών. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 16 κ.εκ. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. **Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά:** Για Φυλλοκνίστη με 10-15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 7,5 κ.εκ. (max) σε 10-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, να χρησιμοποιηθεί πριν τα δένδρα εισέλθουν σε παραγωγική ηλικία (BBCH 31-50). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 5 κ.εκ. **Καρυδιά:** Για Καρτόκαφα, Καστανιά: Για Καρτόκαφα, Κολεόπτερα, Αμυγδαλιά: Για Ανάσρια με 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, όταν ξεκινά η διόγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει (BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του *Rhagoletis completa*. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 18 κ.εκ. **Αμπέλι οινοποίησης:** Για Ευθεμίδα, Κοχυλιδα, **Argyrotaenia pulchellana** με 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 27 κ.εκ. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, λίγο πριν την ανθοφορία έως τον χρωματισμό του μούρου (BBCH 57-83). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 15 κ.εκ. **Αμπέλι Επιτραπέζιο:** Για Ευθεμίδα, Κοχυλιδα, **Argyrotaenia pulchellana** με 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 21,6 κ.εκ. (max) σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, λίγο πριν την ανθοφορία έως το ΡΗ1 (BBCH 57-85). Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Ελάχιστη δόση /στρέμμα 15 κ.εκ. **Πατάτα:** i) Για Δορυφόρο με 5-6 κ.εκ. (max) σε 30-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, έως την ολοκλήρωση της ανθοφορίας (BBCH 31-69). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. ii) Για Φθορία με 12,5-17,5 κ.εκ. (max) σε 30-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, έως το κίτρινισμα των φύλλων (BBCH 31- 93). Συνιστάται να

χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες πτήσεις ακμαίων. Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. **Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι:** Για Πυραλίδα, Σεξάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα με 10-15 κ.εκ. (max) σε 30-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, πρώτη εφαρμογή από το 4ο φύλλο μέχρι την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου (BBCH 14-55), δεύτερη εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των σπόρων έως λίγο πριν την ωρίμανση (BBCH 73-87). Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-30 ημέρες. Ελάχιστη δόση εφαρμογής 10 κ.εκ./στρέμμα. **Βαμβάκι:** Για Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι με 20 κ.εκ. (max) σε 30-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές, από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών έως το 70% των καψών να έχει αποκτήσει το τελικό μέγεθος (BBCH 34-77). Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά. 2. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τη Σατσούμα. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** ● Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρές. ● Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. ● Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει δυο (2) ώρες μετά τον ψεκασμό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: ● εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, ● να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό, ● να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας, ● εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε το προϊόν απευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το προϊόν να αναμιχθεί πλήρως με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε την ίδια μέρα.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεσοσκληρικές χρήσεις: Αμπέλι επιτραπέζιο: 3 ημέρες. Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι: 7 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Πατάτα: 14 ημέρες. Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Βαμβάκι: 21 ημέρες. Αμπέλι οινοποίησης: 30 ημέρες. Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Σατσούμα, Λεμονιά: Μη εφαρμόσιμο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

04/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 50422, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —