



NEO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT

SINIALO®

Deltamethrin (Ντελταμεθρίν) 2,5 %
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων



Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες **deltamethrin**, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. 1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τριεξ (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: 3 ημέρες: Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα. 7 ημέρες: Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη), Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Κρεμμύδι, Μαρούλι, Πράσο, Σκόρδο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φακές, Ρεβίθια, Μπιζελια-Αρακάς, Πατάτα, Καπνός. 14 ημέρες: Μηδική. 30 ημέρες: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευπλα, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σίταρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΖ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

06/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr




Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθροειδείς εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά): i) Αφίδες με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάριο, Μύγα της Μεσογείου, Χρήσεις ήσσονος σημασίας (Ανατολική μύγα των καρπών****, Μύγα των ροδάκινων****) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά): Αφίδες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): i) Αφίδες με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.εκ. σκευ. σε 140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καρπόκαφα Καρυδιάς, Καρπόκαφα Καστανιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. iii) Ευρύτομο με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την έναρξη των πτήσεων των ακμιαίων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσαουλιά): i) Καρπόκαφα, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς με 30-50* κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτερες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-50 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά): i) Φυλλοδέτερες, Ανάρσια με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35-49 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέπια, Χρήσεις ήσσονος σημασίας (Ανατολική μύγα των καρπών****, Μύγα των ροδάκινων****) με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες, Καρπόκαφα της Δαμασκηλιάς με 35-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Αμπέλι:** i) Ευδεμίδα με 50 κ.εκ. σκευ. (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2η και 3η γενιά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοχυλίδα με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκι, με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού): i) Πυρηνότρητης (ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς) με 30-40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σκευ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας. ii) Δάκος, Χρήσεις ήσσονος σημασίας (Ανατολική μύγα των καρπών****, Μύγα των ροδάκινων****) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμιαίων στις παγίδες. iii) Λεκάριο με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. iv) Βαμβακάδα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-70 κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.

Φράουλα (Υ): Αφίδες, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Φράουλα (Θ): Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: Κοφτοσκούληκα, Θρίπας με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): i) Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Άλτης, Μαμέστρα, Κοφτοσκούληκα, Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. ii) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Βρωμόσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Πιπεριά (Υ+Θ): i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 30-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμόσα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 18-30 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και 18-42 (Θ) κ.εκ.

σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 (Θ) κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 42-70 (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες (Υ) και μέχρι 4 ψεκάσμοι ανά 7 ημέρες (Θ) με την εμφάνιση των προσβολών.

Κολοκυθάκι (Υ+Θ): (Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Μαμέστρα, Σποντόπτερα), **Αγγούρι, Αγγουράκι (Υ+Θ):** (Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα), **Πεπόνι (Υ+Θ):** (Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Κοφτοσκούληκα), **Καρπούζι (Υ+Θ):** (Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Μαμέστρα), **Κουνουπίδι - Μπρόκολο:** (Αφίδες, Πιρίδα, Κοφτοσκούληκα, Πράσινο σκουλήκι, Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πιλούτella), με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Μαρούλι (Υ): i) Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Αφίδες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Ρόκα: i) Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Άλτης με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Μπιζελία φρέσκα (αρακάς): i) Αφίδα των μπιζελιών, Σπίτωνα με 25 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών, Κάμπια των μπιζελιών, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Ψυχανθή (όσπρια), Φακή - Ρεβίθια: Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Πατάτα: i) Δορυφόρος με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Βαμβάκι: i) Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης, Τζιτζικάκι με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα, Αφίδα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση της προσβολής.

Καπνός: Κοφτοσκούληκα, Θρίπας με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Ζαχαρότευλα, Παντζάρι: i) Αφίδες, Μύγα των τεύλων, Άλτης, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κασσίδα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Αραβόσιτος:** i) Πυραλίδα, Σεζμία, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 14-21 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών. ii) Διαβρώτικα με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Για την Διαβρώτικα εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): Αφίδες, Κοφτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. 1 ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών.

Μηδική: Αφίδα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος με 25 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 2 ψεκάσμος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

Καλλωπιστικά (Υ+Θ): i) Αφίδες, Θρίπες με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτερες με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17-35 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Μέχρι 3 ψεκάσμος ανά 7 ημέρες με την εμφάνιση των προσβολών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/λίτρου πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. ***Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp. ****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, γκρέιπφρουτ, νεραντζιάς, πυρηνόκαρπων, ελιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.



06/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —