



Πυκνό εναιώρημα (SC)
Azoxystrobin (Αζοξυστρομπίνη) 25% β/ο

NEO

YAKAMA®

Το σκεύασμα είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρίνων, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Αμπέλι (επιτραπέζιο, ονοποποίηση): i) Για **Οιδίο** με 65-150^g κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75^g κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για **Περωνόσπορο** με 85-200^g κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100^g κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης, όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους (BBCH 13-81). **Αγκινάρα:** Για **Οιδίο** με 80 κ.εκ. σε 50-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοστάδας (κεφαλής) (BBCH 15-55). **Σπαράγγι:** i) Για **Σκωρίαση**, **Στεμφύλιο** με 80 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 41-89). **Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** Για **Οιδίο** με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Τομάτα (θερμοκηπίου):** i) Για **Οιδίο** με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για **Αλτερνάρια**, **Περωνόσπορο** με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Κολοκυθάκια (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Για **Οιδίο** με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Για **Περωνόσπορο** με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για **Οιδίο** με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** i) Για **Περωνόσπορο** με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. ii) Για **Οιδίο** με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** Για **Οιδίο** με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 10 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Σκόρδο:** Για **Σκωρίαση** με 80 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH 14-48). **Κρεμμύδια (ξηρά):** Για **Περωνόσπορο** με 80 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH 14-48). **Φράουλα (υπαίθρου):** Για **Οιδίο** με 80 κ.εκ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα (BBCH 51-89). **Καρότο:** Για **Οιδίο**, **Αλτερνάρια** με 80-100 κ.εκ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 ψεκασμοί φυλλώματος / 7 ημέρες. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως του ριζά φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 16-49). **Παρατηρήσεις:** 1. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα (75 κ.εκ. σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). 2. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκατικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκατικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκατικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο

ψεκατικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** ● Μην ψεκάτε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό. ● Να αποφεύγεται η μεταφορά ψεκατικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες. ● Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διπλανή καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει azoxystrobin, ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 11 κατά **FRAC**. ● Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες. ● Για το μύκητα *Uncinula necator* επιτρέπονται έως δύο διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. ● Για το μύκητα *Plasmopora viticola* επιτρέπεται μία εφαρμογή με το σκεύασμα ανά τρεις εφαρμογές. ● Εφαρμόστε το σκεύασμα σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπιλουρίνων (QoIs) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. ● Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκατικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες αμπελιού ένα ελαφρό, διάχυτο κίτρινοσμα των φύλλων που βασίζεται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με σκεύασμα. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν παρουσιαστεί. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκατικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το σκεύασμα, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --.

Τελειότητα επέμβασης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι: 21 ημέρες. Σκόρδο, Κρεμμύδια ξηρά, Καρότο: 14 ημέρες. Αγκινάρα: 7 ημέρες. Κολοκυθάκια (Υ/Θ), Αγγούρι (Υ/Θ), Πεπόνι (Υ/Θ), Καρπούζι (Υ/Θ), Πιπεριά (Υ/Θ), Τομάτα (Θ), Φράουλα (Υ): 3 ημέρες. Σπαράγγι: Μη εφαρμοσμένο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΖ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

05/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —