



ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Bifenox (Μπιφενόξ) 28% β/ο
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

BARLATO



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Προϊόν αναφοράς: SONAVIO
Βιθενox (Μπιφενόξ) 28% β/ο
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Εγγυημένη ανόθευση του σκευάσματος:
Δραστικό ουσία: Βιθενox 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 58,1% β/β

Ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται προφυτρωτικά αλλά και χωρίς μεταφυτρωτικά με δράση εναντίον πλατυφύλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και κυρίως από τις ρίζες των ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: ● Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις ● Πυρίμα 1,2-επεξεργασμένο ζιζανιοκτόνο. Αποφύγετε να προκαλείτε αλλεργική αντίδραση ● Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, για την ορθή χρήση υγρού και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (lt)

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
ΕΕCΑ Ημερ. λήξης: Βλέπε επί της συσκευασίας
Κάτοχος της άδειας παραλλήλου εμπόρου: Υπεύθυνος για τη διανομή στην αγορά, Διανομέας:
NitroFarm
— από το 1976 —
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη, Free-phone: 800 11 820 820, Τηλ.: 2310 553354-7, Φαξ: 2310 545235, e-mail: info@nitrofarm.gr, url: www.nitrofarm.gr



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
5LT / 1LT / 500cc / 100cc



Ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται προφυτρωτικά αλλά και χωρίς μεταφυτρωτικά με δράση εναντίον πλατυφύλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και κυρίως από τις ρίζες των ζιζανίων.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Τομάτα: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με 80-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, 5 ημέρες πριν τη μεταφύτευση (BBCH 00) και μεταξύ των μηνών Απριλίου - Ιουλίου.
Μαρούλι, Λυκωτρίβολο, Σκαρόλες, Πλατύφυλλα Αντίδια: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με 80-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, 5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση (BBCH 00) και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου.
Καρότο: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με 80-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, μετά τη μεταφύτευση έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 13-14) και μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου - Οκτωβρίου.
Κρεμμύδι (από βολβούς), Σκόρδο, Ασκαλώνια: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με: i) 75-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, μετά την σπορά των βολβών πριν το φύτευμα των φυτών (BBCH 00) και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου. ii) 50 κ.εκ. (1") και 50 κ.εκ. (2") σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 2 σπαστές εφαρμογές / 7 ημέρες έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας BBCH 13-14 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου.
Αγκινάρα: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με 80-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, πριν τη μεταφύτευση (BBCH 00) και μεταξύ των μηνών Αυγούστου - Ιανουαρίου ή κατά τη διάρκεια του ληθάργου (BBCH 90-00) και μεταξύ των μηνών Αυγούστου - Ιανουαρίου.
Μαϊντανός: Για Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια με 80-100 κ.εκ. σε 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 1 εφαρμογή, 5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση (BBCH 00) και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καταπολεμώμενα ζιζάνια:
-Τομάτα: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), -Μετρίως ευαίσθητα: Βλήτο (*Amaranthus sp.*) (*Chenopodium sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*).
-Μαρούλι, Λυκωτρίβολο, Σκαρόλες, Πλατύφυλλα Αντίδια: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτο (*Amaranthus sp.*), Καλέντουλα (*Calendula arvensis*), Ροφανίδα (*Diploxis virgata*), Τσουκνίδα (*Urtica urens*), -Μετρίως ευαίσθητα: Βλήτο (*Amaranthus sp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), (*Chenopodium sp.*), (*Fumaria officinalis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτάκος (*Senecio vulgaris*).
-Καρότο: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Μετρίως ευαίσθητα: Αντράκλα (*Portulaca oleracea*). Μεταφυτρωτικές εφαρμογές ή μετά τη Μεταφύτευση -Μετρίως ευαίσθητα: Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).
-Κρεμμύδι (από βολβούς), Σκόρδο, Ασκαλώνια: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), (*Chenopodium sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Σετάρια (*Setaria viridis*), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), Ζυγός (*Sonchus oleraceus*). Μεταφυτρωτικές εφαρμογές ή μετά τη Μεταφύτευση -Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), -Μετρίως ευαίσθητα: Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*).
-Αγκινάρα: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), -Μετρίως ευαίσθητα: Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγρία Ρόκα (*Diploxis virgata*), Σετάρια (*Setaria viridis*).
Μαϊντανός: -στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση -Μετρίως ευαίσθητα: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοεισίας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική Bifenox, η οποία ανήκει στην ομάδα E κατά HRAC. Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να σπαρθούν καλαμπόκι και ηλιάνθος και να μεταφυτευτούν τομάτα και καπνός. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συνιστάται και κάτω από τις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες. Μερικά παροδικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στις καλλιέργειες καρότου, κρεμμυδιού, αγκινάρας, τομάτας και μαρουλιού χωρίς όμως να επηρεάζουν την απόδοση.
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπεκ τύπου ακούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm. (45 psi) με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανόδευση.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανόδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανόδευση.
Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσκευαστικές χρήσεις (ημέρες): Τομάτα, Μαρούλι, Λυκωτρίβολο, Σκαρόλες, Πλατύφυλλα αντίδια, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Αγκινάρα, Μαϊντανός. Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική παραβίαση συσκευασίας του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —