Πυκνό Διάλυμα (SL)
Δραστική ουσία: 18% β/ο
(24.29 β/ο glyphosate σε μορφή isopropylamine salt)

BGT

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT / 10LT / 20LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ[1], ΚΕΧΡΙ[1]: Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 250-300 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός. Φεβρουάριο-Ιούλιο/Πριν και μετά τη σπορά (προφυτρωτικά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-800 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός. Απρίλιο-Οκτώβριο/κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (σιτηρών, αραβοσίτου, ελαιοκράμβης και άλλων): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός. Ιούλιο-Νοέμβριο/Μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, σε μέγεθος ζιζανίων μετά τα 2 πραγματικά φύλλα (BBCH 12). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά[2], Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική Μουσμουλιά): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-600 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Απρίλιο-Νοέμβριο/Κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-81). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΛΩΤΟΣ[1]: Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-700 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά[2], Μανταρινιά, Λεμονιά[1,2], Γκρέιπ-φρουτ[1,4]): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-700 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-79 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ[1] (Νεκταρινιά, Κερασιά[2], Δαμασκηνιά[3]): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-700 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-600 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-79 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. **ΕΛΙΑ (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-700 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-81 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.**ΑΚΡΟΔΡΥΑ[1] (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κουκουναριά): Για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*:** 400-700 κ.εκ./στρ. σε 10-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο-Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες πυρηνοκάρπων, ακρόδρυων, λωτού, σόργου και κεχριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε αυτές τις καλλιέργειες να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. **2**. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει το κίτρο. **3**. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νερατζιά και το περγαμόντο. **4**. Η χρήση στο γκρέιπ-φρουτ περιλαμβάνει τη φράπα. **5**. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει την αχλαδομηλιά. **6**. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά. **7**. Η χρήση στη δαμασκηνιά περιλαμβάνει τη κορομηλιά. **8**. Εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης σε λωρίδες που καλύπτουν το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. **9**. Μην το εφαρμόζεται στο γλυκό καλαμπόκι. **10**. Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών). **11**. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. **12**. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή. **13**. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πολυετών ζιζανίων στους αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, να τηρείται ελάχιστο διάστημα 3 ημερών μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας. ***Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:** ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ-ΣΟΡΓΟ-ΚΕΧΡΙ: Ευαίσθητα: *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβακιά), *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι), *Xanthium strumarium* (Αγριομελιτζάνα), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας), Μετρίως ευαίσθητα: *Helminthotheca echioides* (Πικρής), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο). ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ευαίσθητα: *Sonchus asper* (Ζωχός τραχύς), *Sonchus arvensis* (Ζωχός), Μετρίως ευαίσθητα: *Rumex crispus* (Λάπαθο). ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Ευαίσθητα: *Capsella bursa-pastoris* (Καψέλλα), *Lamium amplexicaule* (Δωδεκάνθι), *Papaver rhoeas* (Παπαρούνα), *Stellaria media* (Στελλάρια), *Setaria viridis* (πράσινη Σετάρια), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι). ΜΗΛΟΕΙΔΗ: ● Δόση 400-600 κ.εκ./στρ. Ευαίσθητα: *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Sonchus oleraceus* (Ζωχός), *Taraxacum officinale* (Αγριοραδίκι), *Hordeum murinum* (Αγριοκρίθαρο), Μετρίως ευαίσθητα: (δόση 400 κ.εκ./στρ.), *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα). ● Δόση 600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Malva sylvestris* (Μολόχα). ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: ● Δόση 400-700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Sonchus oleraceus* (Ζωχός), Μετρίως ευαίσθητα: Malva sylvestris (Μολόχα). ● Δόση 400 κ.εκ./στρ., Μετρίως ευαίσθητα: Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα). ● Δόση 700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Conyza bonariensis* (Μικρή Κόνυζα). ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ● Δόση 400-600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Sonchus oleraceus* (Ζωχός), *Taraxacum officinale* (Αγριοραδίκι), *Hordeum murinum* (Αγριοκρίθαρο), Μετρίως ευαίσθητα: (δόση 400 κ.εκ./στρ.), *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα). ● Δόση 600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Malva sylvestris* (Μολόχα). ● Δόση 700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Conyza bonariensis* (Μικρή Κόνυζα). ΕΛΙΑ: ● Δόση 400-700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Sonchus oleraceus* (Ζωχός), *Taraxacum officinale* (Αγριοραδίκι), *Lolium multiflorum* (Πολύανθη ήρα). ● Δόση 700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Anagallis arvensis* (Αναγαλλίδα), *Picris hieracioides* (Πικραλίδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Conyza bonariensis* (Μικρή Κόνυζα), *Conyza canadensis* (Κόνυζα). ΑΚΡΟΔΡΥΑ - ΛΩΤΟΣ: ● Δόση 400-600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Sonchus oleraceus* (Ζωχός), *Taraxacum officinale* (Αγριοραδίκι), *Hordeum murinum* (Αγριοκρίθαρο), Μετρίως ευαίσθητα: (δόση 400 κ.εκ./στρ.), *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα). ● Δόση 400-700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Lolium multiflorum* (Πολύανθη ήρα). ● Δόση 600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Malva sylvestris* (Μολόχα). ● Δόση 700 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Anagallis arvensis* (Αναγαλλίδα), *Picris hieracioides* (Πικραλίδα), Μετρίως ευαίσθητα: *Conyza bonariensis* (Μικρή Κόνυζα), *Conyza canadensis* (Κόνυζα). ΑΜΠΕΛΙ: ● Δόση 400-600 κ.εκ./στρ., Ευαίσθητα: *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Daucus carota* (Καρότο), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ● Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το ψεκασμένο έδαφος να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα μέρη (καρποί, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιεργειών. ● Δεν επιτρέπεται η συλλογή ελαιοκάρπων από έδαφος που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα πριν την πάροδο 28 ημερών από την εφαρμογή. ● Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. ● Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Τρόπος εφαρμογής:** Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Ακαλλιέργητες εκτάσεις, βιομηχανικές περιοχές, Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας: -. Ελιά (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): 7 ημέρες για τους καρπούς που συλλέγονται από το δέντρο, 28 ημέρες για τους καρπούς που συλλέγονται από το έδαφος. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κορομηλιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κουκουναριά, Λωτός: 42 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

DUN & BRADSTREET D-U-N-S® REGISTERED™

Μέλος του: ECCA european crop care association

07/2026

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —