


ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Pyridaben (Πυριταμπέν) 10% β/ο
Αιώρημα συμπυκνωμένο (SC)

ELARON

Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση κινητών μορφών ακάρεων και του αλευρώδους σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Έχει ταχεία δράση (knockdown) και μακρά υπολειμματική διάρκεια.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
1LT / 300cc / 100cc



Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): Για Τετράνυχους (*Tetranychus* sp.), Κόκκινο τετράνυχο (*Panonychus ulmi*) και Αλευρώδεις (*Trioletodes vaporariorum*), (*Bemisia tabaci*) με 140-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ. (max) σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση της πρώτης ταξανθίας/άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση (BBCH 51-89).

Αγγούρι - Αγγουράκι για τουρσί - Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου): Για Τετράνυχους (*Tetranychus* sp.), Κόκκινο τετράνυχο (*Panonychus ulmi*) και Αλευρώδεις (*Trioletodes vaporariorum*), (*Bemisia tabaci*) με 140-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ. (max) σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του πρώτου άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση (BBCH 51-89).

Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, φυτώρια δέντρων και θάμνων): Για Τετράνυχους (*Tetranychus* sp.), Κόκκινο τετράνυχο (*Panonychus ulmi*) και Αλευρώδεις (*Trioletodes vaporariorum*), (*Bemisia tabaci*) με 140 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ. (max) σε 50-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιφφρουτ, Λεμόνια, Μανταρινιά, Φράπα, Λιμετσία/Πράσινο λεμόνι, Κιτριά, Νεραντζιά): Για Κόκκινο τετράνυχο (*Panonychus citri*) και Χρήση ήσσονος σημασίας: Μαύρο αλευρώδη* (*Aleurocanthus spiniferus*) με 150-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ. (max) σε 150-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής, από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή (BBCH 69-83).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στα λαχανικά, η μέγιστη δόση/100 λίτρα νερό θα πρέπει να συνδυαστεί με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση/στρ. 2. Συνιστάται μια εφαρμογή ανά έτος, με καλή διαβροχή των φυτών, με την εμφάνιση των κινητών μορφών ακάρεων (προνύμφες και ακμια). *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του μαύρου αλευρώδη στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική pyridaben, η οποία ανήκει στην ομάδα 21 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων-ακάρεων στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνοι) συνιστάται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πορτοκαλιά, Νεράντζια, Γκρέιφφρουτ, Φράπες, Λεμόνια, Κιτρολέμονα, Μανταρινιά, Πράσινα λεμόνια (Λιμετσία): 14 ημέρες. Τομάτες (Θ), Πιπεριές (Θ), Μελιτζάνες (Θ), Αγγούρια (Θ), Αγγουράκια για τουρσί (Θ), Κολοκυθάκια (Θ): 3 ημέρες. Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνοι): Δεν απαιτείται.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

07/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —