

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.  
Προϊόν αναφοράς: SYLLIT 544 SC

# STRATUS

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) • Dodine (Ντοντίν) 54,4% β/ο

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 500cc / 1LT / 5LT



**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την αντιμετώπιση των: Φουζικλάδιο των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά και Μουσμουλιά), Κυλινδροσπορίωση και Ανθράκνωση της Κερασιάς, Εξώασκο της Ροδακινιάς, της Νεκταρινιάς και των συναφών υβριδίων και Κυκλοκόνιο και Γλοισπορίο της Ελιάς.**

**Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιέργεια/περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:**

**Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά):** Για Φουζικλάδιο με 83-625 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125 κ.ε. (max) σε 20-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες από τη δόγκωση των οφθαλμών (πρόσθινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

**Κερασιά:** Για Ανθράκνωση, Κυλινδροσπορίωση με 83-250 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125 κ.ε. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες από την έναρξη της άνθησης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) καίλι μετά τη συγκομιδή.

**Ροδακινιά:** Για Εξώασκο με 110-330 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 165 κ.ε. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες από τη δόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) καίλι αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).

**Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιολαίμμες ποικιλίες):** Για Κυκλοκόνιο, Γλοισπορίο, Χρήσις ήσσονος σημασίας (Κερκόσπορα\*\*). **Αλτερνάρια\*\*** με 125-165 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-165 κ.ε. (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) καίλι το φθινόπωρο.

**Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Λάιμ, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ:** Για Αλτερνάρια με 50-125 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125 κ.ε. (max) σε 100-250 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως την αρχή του χρωματισμού των καρπών (BBCH 81).

**Καρυδιά\* - Καστανιά\* (χρήσις ήσσονος σημασίας):** Για Ανθράκνωση με 83-250 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125 κ.ε. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

**Φιστικιά\* (χρήσις ήσσονος σημασίας):** Για Σεπτόρια, Βοτρυοσφαίρια, Αλτερνάρια με 83-250 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125 κ.ε. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

**Αμυγδαλιά\* (χρήσις ήσσονος σημασίας):** Για Εξώασκο, Κλαδοσπορίωση, Κορύνιο με 110-330 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 165 κ.ε. (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/σπρέι. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

**Παρατηρήσεις:** 1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά. 2. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσανιά. 3. Για τα επιτραπέζια ελαιόλαδα συστήνεται η εφαρμογή του σκευάσματος από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και το φθινόπωρο στους νεαρούς καρπούς (BBCH 71-79). \*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρυδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και

αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. \*\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της κερκόσπορας και της αλτερνάριας στην ελιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Συστήνεται να αποφευχθούν οι εφαρμογές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προετοιμασμένης καλλιέργειας:** Δεν απαιτείται, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφανείες των φυλλών.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στην επιτραπέζια ποικιλία ελιάς Χαλκιδικής, η εφαρμογή του φθινοπώρου συστήνεται να γίνεται μετουλλεκτικά.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως (είτε προληπτικά με εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή θεραπευτική εφαρμογή 24 ώρες μετά τη μόλυνση, αν υπάρχουν θερμοκρασίες που ευνοούν την ασθένεια ή 48 ώρες μετά τη μόλυνση, σε περίπτωση δρασερότερων συνθηκών).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, υπό ελαφρά ανάδευση. Εφαρμόστε απ' ευθείας μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

**Συνδυαστικότητα:** --

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Μεσπιλιά: 60. Κερασιά, Βυσανιά: 14. Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 75. Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιολαίμμες ποικιλίες): 7. Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρούτ, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια-lime: 21. Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά: 120.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική από κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες παγετού (κάτω από 0°C). Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΝΟΜΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο **EN ISO 9001:2015** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο **EN ISO 14001:2015**

07/2026



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —