

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Metallic Copper (Μεταλλικός Χαλκός) 30% (β/β) +
Cymoxanil (Συμοξανίλ) 6% (β/β)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Famiglia

Μυκητοκτόνο επαφής και διασυστηματικό με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περονόσπορου.

Μίγμα δύο δραστικών ουσιών του cymoxanil με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του υδροξείδιου του χαλκού μυκητοκτόνου επαφής με δράση σε πολλαπλά σημεία με αντισπορογόνο δράση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1Kg / 10Kg



Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια: Για **Περονόσπορο** (*Plasmopara viticola*) με 200 γρ. σκευάσματος σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1-4 εφαρμογές / 7 ημέρες από τη διόγκωση των ταξιανθιών, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με τα πρώτα συμπτώματα, μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των ραγών (BBCH 55-80)

Πατάτα: Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*) με 200 γρ. σκευάσματος σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1-5(*) εφαρμογές / 7 ημέρες από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με τα πρώτα συμπτώματα, έως την έναρξη του κιτρινίσματος των φύλλων (BBCH 21-90). *Στις πρώιμες καλλιέργειες πατάτας να πραγματοποιείται **μόνο μια εφαρμογή** ανά καλλιεργητική περίοδο.

Τομάτα(Υ): Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*), Αλτερνάρια (*Alternaria solani*) με 200 γρ. σκευάσματος σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1-4 εφαρμογές / 7 ημέρες που αρχίζουν από την άνθηση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με τα πρώτα συμπτώματα, μέχρις ότου οι καρποί αποκτήσουν το τυπικό μέγεθος της ποικιλίας (BBCH 51-71)

Παρατηρήσεις: Προσαρμόστε κατάλληλα τον επιθυμητό αριθμό εφαρμογών στο πρόγραμμά σας καθώς και τις εφαρμοζόμενες κάθε φορά δόσεις χαλκούχων σκευασμάτων, ώστε η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκού (Cu) να μην υπερβαίνει τα 2,8 κιλά σε διάστημα 7 ετών. Συνιστάται να τηρείται ο μέσος όρος εφαρμογής των 400 γρ. Cu/στρέμμα ετησίως

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες **copper hydroxide** και **cymoxanil**, οι οποίες ανήκουν στις **ομάδες M01 και 27** κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Διαλύστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι σακούλες/σάκοι μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια: 28 ημέρες. Πατάτα: 14 ημέρες. Τομάτα για νωπή κατανάλωση: 3 ημέρες. Βιομηχανική τομάτα: 10 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

10/2026

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —