

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Δραστική ουσία: fluroxypyr (methylheptyl ester) 20% β/ο

GALISTOP 200

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα). Η δραστική ουσία fluroxypyr απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Σίκαλη, Βρώμη, Κριθάρι (χειμερινό), Σιτάρι (χειμερινό): Για πλατύφυλλα ζιζάνια: 250-670 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 100 κ.εκ. (max) σε 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας (BBCH 13-39).
Κριθάρι (ανοιξιάτικο), Σιτάρι (ανοιξιάτικο): Για πλατύφυλλα ζιζάνια: 185-500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 75 κ.εκ. (max) σε 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας (BBCH 13-39).
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος, Αραβόσιτος: Για πλατύφυλλα ζιζάνια: 250-670 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 100 κ.εκ. σε 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο στάδιο από το 3ο έως το 5ο φύλλο (BBCH 13-15).
Λειμώνες αγρωστωδών: Για πλατύφυλλα ζιζάνια: 500-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 200 κ.εκ. (max) σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (BBCH 13-31).
Ελιά, Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια), Μανταρινιά): Για πλατύφυλλα ζιζάνια: 375-750 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 κ.εκ. (max) σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.
Παρατηρήσεις: 1. Μην εφαρμόζεται πριν την 1η Μαρτίου τη χρονιά της καρποφορίας στην ελιά. **2.** Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή. **3.** Η εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες. **4.** Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. **5.** Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. **6.** Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για εστιακές εφαρμογές σε μόνιμους λειμώνες, σε αμειψισπορά ή σε νέα σπορά λειμώνων αγρωστωδών, η μέγιστη συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 κ.εκ./100 L νερού. **7.** Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το σκληρό σιτάρι, την όλυρα και το τριτικάλε. **8.** Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόντο και την νεραντζιά. **9.** Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα. **10.** Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτρολεμονιά.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτο *Amaranthus sp.*, *Amaranthus albus*, *Amaranthus retroflexus*, Σινάπι το μέλαν *Brassica nigra*, Καλέντουλα *Calendula officinalis*, Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis*, Καπνόχορτο *Fumaria officinalis*, Αγριοκαρότο *Daucus sp.*, Άγρια ρόκα *Diplotaxis erucoides*, Κολλητσίδα *Galium aparine*, Ηλίανθος *Helianthus annuus*, Αγριομάρουλο *Lactuca serriola*, Μολόχα *Malva sp.*, Σολανόν το κίτρινο *Solanum luteum*, Αγριοντοματιά *Solanum nigrum*, Πικραλίδα *Picris hieracioides*, Πολυκόμπι *Polygonum aviculare*, Αναρριχώμενο πολύγωνο *Polygonum convolvulus*, Γλιστρίδα *Portulaca oleracea*, Λάπαθο *Rumex crispus*, Μεγάλο λάπαθο *Rumex obtusifolius*, *Ζωχός Sonchus sp.*, Αγριοράδικο *Taraxacum sp.*, Πεντάνευρο *Plantago lanceolate*, Αγριοντοματιά *Solanum nigrum*, Στελλάρια *Stellaria media*, Ασπράγκαθο *Xanthium spinosum*, Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium*.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσιο *Cirsium acaule*, Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis*, Ερίγερο *Erigeron sp.*, Χαμαισική *Euphorbia chamaesyce*, Δωδεκάνθι *Lamium amplexicaule*, Μαρτιάκος *Senecio vulgaris*, Περδικούλι *Parietaria judaica*.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ● Μην προβαίνετε σε όργωμα του εδάφους έως ότου περάσουν 7 ημέρες από την εφαρμογή. ● Χρησιμοποιήστε το προϊόν ημέρες χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας προφυλάξεις για την αποφυγή βλαβών σε γειτονικές καλλιέργειες και για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των ψεκασμών. ● Να μην εφαρμόζετε σε δέντρα (ελιές & εσπεριδοειδή) μικρότερα των 4 ετών. Να μη διαβρέχετε τα δέντρα και ειδικότερα τους νεαρούς βλαστούς.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει fluroxypyr, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα O κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Η επανείσοδος των ζώων στους λειμώνες να γίνεται μετά από 14 ημέρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας ή με ψεκαστήρα πλάτης για τις ελιές, εσπεριδοειδή.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ελιές (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες): 120 ημέρες. Σίκαλη, Βρώμη, Κριθάρι, Σιτάρι, Σκληρό σιτάρι, Όλυρα, Τριτικάλε, Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός, Αραβόσιτος, Λειμώνες αγρωστωδών, Γκρέιπφρουτ, Φράπα, Πορτοκάλια, Νεράντζια, Περγαμόντα, Λεμόνια, Κιτρολέμονα, Πράσινα λεμόνια, Μανταρίνια: 15 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

09/2026

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη
NitroFarm
— από το 1976 —