

Paclobutrazol 25% β/ο
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

PANKY

Δρα παρεμποδίζοντας την σύνθεση γιββερελλίνης. Απορροφάται από τα φύλλα, τους βλαστούς και τις ρίζες των φυτών και περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών. Ελαττώνει το μήκος των βλαστών και την απόσταση μεταξύ τους, ευνοεί το σχηματισμό πλευρικών βλαστών και ανθών. Αυξάνει την καρποφορία, βελτιώνει την ποιότητα των καρπών και διευκολύνει την συγκομιδή.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Μηλιά, Αχλαδιά: Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των βλαστών, την αύξηση της καρποφορίας, τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και τη διευκόλυνση της συγκομιδής. Δόση εφαρμογής ανά στρέμμα: 20 κ.εκ. σκευάσματος. Δόση εφαρμογής ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού: 20 κ.εκ. σκευάσματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των καρπών, από BBCH 73. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες.

Ροδακινιά, Δαμασκηνιά: Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των βλαστών, την αύξηση της καρποφορίας, τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και τη διευκόλυνση της συγκομιδής. Δόση εφαρμογής ανά στρέμμα: 80 κ.εκ. σκευάσματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 250-500 κ.εκ. ανά δέντρο. Εφαρμογή στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, από την αρχή της βλάστησης έως τη ρόδινη κορυφή (BBCH 10-57). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των βλαστών, την αποφυγή της πτώσης των ανθέων, την αύξηση της καρποφορίας και τη διευκόλυνση της συγκομιδής. Δόση εφαρμογής ανά στρέμμα: 20-25 κ.εκ. σκευάσματος. Δόση εφαρμογής ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού: 100-125 κ.εκ. σκευάσματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-20 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος, 2 εβδομάδες πριν την αρχή της άνθησης (BBCH 53-57). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη στις καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνόκαρπων. **2.** Πολύ μεγάλα και ώριμα ή πολύ εύρωστα δένδρα ενδέχεται να μην ελεγχθούν ικανοποιητικά. **3.** Μην το χρησιμοποιείτε όταν τα δέντρα βρίσκονται υπό συνθήκες stress ούτε σε πολύ νεαρά και πρόσφατα φυτεμένα δένδρα που απαιτούν έντονη βλαστική ανάπτυξη. **4.** Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει, για να αποφευχθεί η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες. **5.** Μην το εφαρμόζετε σε οπωρώνες όπου συγκαλλιεργούνται ετήσια φυτά. **6.** Σε καλλιέργειες όπου παρατηρείται κάποια καθυστέρηση στην έκπτυξη των οφθαλμών του προηγούμενου έτους, θεωρείται σκόπιμο να ελαττωθεί η δοσολογία κατά το δεύτερο έτος ή ακόμα και να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου το **PANKY** έως ότου τα φυτά αποκτούν την επιθυμητή ευρωστία.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ---.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: -Ψεκασμός φυλλώματος (Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι). -Εφαρμογη στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν ανοίξετε τη συσκευασία του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής για εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Συνίσταται η εφαρμογή να ξεκινά μετά από πότισμα.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, **τρεις (3) φορές με καθαρό νερό**.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος & της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό ή στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής. Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

09/2026

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm
— από το 1976 —