

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Sulphur 80% β/ο

POL-SULPHUR 800 SC

Μυκητοκτόνο επαφής



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1LT / 5LT

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:

Αμπέλι: Για Ωίδιο (*Erysiphe necator*) με 200-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 400 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο BBCH 15-18. Μέχρι 8 εφαρμογές / 7 ημέρες.

Τομάτα (Υ+Θ): Για Ωίδιο (*Leveillula taurica*) με 135-500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού,200 κ.εκ. σε 40-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 6 εφαρμογές / 10 ημέρες.

Σπάρι, Κριθάρι: Για Ωίδιο *(Blumeria (Erysiphe) graminis)* με 1.000 κ.εκ. σε 15-30 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 2 εφαρμογές / 14 ημέρες.

Τριανταφυλλιά (Υ+Θ): Για Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*) με 300 κ.εκ. σε 45-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέχρι 5 εφαρμογές / 10 ημέρες.

Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής): Για Ακάρεα της οικογένειας *Eriophyidae* με 384 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 320 κ.εκ. σε 100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας). Μέχρι 2 εφαρμογές / 30 ημέρες.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: Για Κλαδοσπόριο (*Cladosporium carpophilum*), Σκωρίαση (*Tranzschelia prunispinosae, Tranzschelia discolor*) **(χρήσεις ήσσονος σημασίας)** με 400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, 600 κ.εκ. σε 150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση των ασθενειών, στα στάδια πτώσης των πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και καρπιδίου. Μέχρι 4 εφαρμογές / 10 ημέρες.

Μελιτζάνα (Υ+Θ): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*), Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.)* **(χρήσεις ήσσονος σημασίας)** με 300 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμός κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Μέχρι 4 εφαρμογές / 10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. **2.** Η δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / στρ. **3.** Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **4.** Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών. **5.** Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. **6.** Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. **7.** Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας (στις καλλιέργειες ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και μελιτζάνας), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας και ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά δεν φέρουν ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Καλλιέργειες υπαίθρου: 6 ώρες, Καλλιέργειες θερμοκηπίου: 8 ώρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: ---

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι: 5 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ): 3 ημέρες. Σπάρι, Κριθάρι: 35 ημέρες. Τριανταφυλλιά: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. Ελιά (πράσινη ελιά Χαλκιδικής): 90 ημέρες. Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μελιτζάνα (Υ+Θ): 7 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες 0-30°C, προφυλαγμένο από απευθείας έκθεση στον ήλιο και από υγρασία και μακριά από εστίες φωτιάς. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

10/2026

www.nitrofarm.gr
info@nitrofarm.gr
Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη
NitroFarm
— από το 1976 —